BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
12
15 C
2M

SENTENTIAE OMNES

ac uerba, quæ in diuini Hippocratis *aphoriſmis continentur, iam recens & accurate in nouum ordinem alphabeticumque digeſta, ut quæuis in ipſis commemorata nũc facilius & celeriusquã antea inueniri queant, ut ita medicinæ ſtudioſis maiori nimirum, quàm prius, uſui futura ſint.*

Sereniſſimo, illuſtriſſimoque Venetiarum *principi*
FRANCISCO VENERIO *dicata.*

Auctoribus ac interpretibus fidiſſimis, Bartholomæo *&* Petro *Roſtiniis doctoribus phyſicis.*

Appoſititia uerba, nempe ad maiorem clarioremq; ipſius auctoris expoſitionem, hoc ſigno ( ) intercludentur.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Cum Gratia & Priuilegio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

NVLLA SINE LABORE EST VIRTVS.

VENETIIS M D L V.

12 15 C 2

C

SERENISSIMO, ILLVSTRISſimoque Venetiarum principi Frāciſco Venerio, Petrus Roſtinius Salutem.

QVO'D Hippocrates ille Gous medicinæ parēs ſit,& maximæ auctoritatis ac maieſtatis ſcriptor, Plato de ipſo copioſe teſtatum in Phædro reliquit. Quòd ubique omnia ueriſſime conſcripſerit, Galenus pluribus in locis aſſerit. iam & ipſe cæterique uenerandæ uetuſtatis auctores ſcriptoresq́ recentes, Hippocratem quanti fecerint, omnibus planè conſtat. At uero Hippocratem, eſſe talem rei medicæ auctorē, ut ſine ipſo res medica integre nequeat conſiſtere,& ego aliàs dixi, & nunc aſſeuerāter affirmo. nam Galenus totus omnem ſuam doctrinam, ut ad amusſim, ad Hippocratem direxit. iam & idem merito facere uoluerunt optimi quiq; philoſophi ac medici & ante & poſt Galenum, ut ineptisſimos & imperitisſimos dixerint, qui unquam ab Hippocrate deſci-

uerunt,quorum non paucos Galenus re
uellit exploditq;.Hic ſane liber omnium
in hac profesſione pulcherrimus, apho-
riſmi ſcilicet,ſunt prora puppisq; ad me
dicinam. Verum ego cum diu conſide-
raſſem,hoſce aphoriſmos ſine ullo ferè
ordine a deſcriptoribus ut inquit Gale-
nus & maleuolis poſitos:exempli gratia
duo tres ue aphoriſmi de morbo quo-
piam uel re alia pronunciant, & ſtatim
relicta ea re uel morbo ,uidetur auctor
ad aliam rem transferri, & in aliis ſectio
nibus poſtea ad primam reuerti, præ-
terea modo ad unam, modo ad aliam
inordinatim traduci:uolui ego ſtudio-
ſorum utilitati conſulere: & ſententias
omnes ac uerba qnæ in diui Hippocra-
tis aphoriſmis inſunt,in pulcherrimum
ordinem & ἀλφαβητικὸν digesſi, ut quæ
uis in ipſis commemorata nunc felicius,
facilius & celerius quàm antea, inueniri
queant,ut ſic maiori quàm prius uſui fu
tura ſint omnibus. item uerba omnia
quæ adiunxi pro dilucidiori ipſius aucto
ris expoſitione, ne auctoris uiderentur,
intra duas παρενθέσεις intercluſi. cum præ

terea animaduerterem aphoriſmos parum fideliter ab aliis translatos in latinam linguam, in unum contuli non certe pauca græcorum exemplaria, ut ex iis meliorem, ſanctiorem, laudabiliorem eligerem lectionem. in quo onere ſubeundo nil a nobis fratribus medicis omiſsū aut negligenter præteritum. id quod lubenti egimus animo: nam Hippocrates, omnium etiam aduerſariorum ſuorum teſtimonio, artē medicam ſinceriſsime et abſolutiſsime tradidit. exhibuimusque omnibus occaſionem, ut illū nobis ſemper imitandum proponamus, & iſto ordine ſemper habeamus in ore, ut nimirum ex hoc ceu limpidiſsimo fonte medicinæ præcepta hauriamus, & non temere (ut ſolet) Arabum turbidos φιλίατροι confectentur riuulos. Scio humanitatē tuā Sereniſſime Princeps licet in grauiſſimis occupationibus leuiora non aſpernari, ſumma ſi quidem natus humanitate, ſuauiſsimis optimisq; moribus, & tua clementia & animi lenitate ſic omnia piis, iuſtis, optimis legibus prudenter moderaris, ut te merito omnes mirifice

colant,uenerentur,obſeruent. omnia toto tuo imperio & ditione ea tranquillitate adminiſtrantur, leges tam pie & ſancte ſeruantur,literarum apud te uigent ſtudia,philoſophiæ genus omne ac theologia ita excolitur,ut placidisſima per te omnes fruamur pace .& tãtarum rerum adminiſtratione omnes iure in te uno ut dixi, probitatem, uigilantiam, prudentiam ſingularem,& omnium deniq; uirtutum cumulum admirantur & ſuſpiciunt. Sed ne longius me prouehat oratio, peto abſte pro incredibili tua erga omnes qui literas profitentur uolũtate, ne grauere meos qualeſcunq; ſunt laborum fructus,uirtutum tuarum ſplendore defendere,& me, tibi fidisſimum ſeruum,tegere ac tueri,& ita ad maiora tuo nomini conſecranda nos extimulabis .te ſoſpitem & incolumem oro centenniũ cõſeruet deus.Vale felicisſime Princeps.

SENTENTIAE OMNES AC VERba, quę in Aphoriſmis Hippocratis diui continentur, in ordinem alphabeticum recens & accurate digeſta; ut ita omnibus Medicinæ ſtudioſis maiori, quàm prius, uſui futura ſint.

Auctoribus, & interpretibus Bartholomeo & Petro Roſtinijs, doctoribus medicis.

Numerorum, qui aphoriſmis omnibus præponuntur, primus aphoriſmorum ſectionem ſeu partem, alter uero aphoriſmi citationem notat.)

ABORTIO.

5.31 Mulier grauida ſanguine miſſo ABORTIT, idq; magis, ſi maior ſit fœtus.

5.34 Mulieri grauidæ aluus nimis fluens ABORTIENDI periculum (eſt).

5.37 Mulieri grauidæ ſi mammæ repente graciles factæ fuerint, ABORTIT.

5.38 Mulieri grauidæ ſi altera mamma extenuata fuerit geminos ferenti, alterum ABORTIT: & ſiquidem dextra extenuata fuerit, marem; ſi uero ſiniſtra, fœminam.

5.44 Quæcunq; (mulieres) præter naturam tenues uterum gerunt, ABORTIVNT bimeſtres, priusquam craſſeſcant:

5.45 Quæcunque mediocrem habitum corporis habentes ABORTIVNT bimeſtres aut trimeſtres ſine cauſa manifeſta, ijs uteri acetabula mucore plena ſunt, & non poſſunt ſuſtinere præ grauitate fœtum, ſed abrumpitur.

5.53 Quæcunque ABORTVM facturæ ſunt ijs mammæ tenues fiunt: at ſi duræ factæ fuerint, dolor erit uel in mammis uel in coxis uel in genibus uel in oculis, & non ABORTIENT.

5.55 Quæ grauidæ à febribus corripiuntur, et uehementer extenuantur ſine cauſa manifeſta, (eæ) ægre & periculoſe pariunt, aut ABORTIENTES periclitantur.

7.27 Mulieri grauidæ teneſmus ſi ſuperuenerit, (eam) ABORTIRE facit.

ABSCEDO.

6.45 Vlcera quæcunque annua fiunt aut longiore tempore durant, neceſſe eſt (in ijs) os ABSCEDERE, & cicatrices cauas fieri.

ABSCESSVS.

4.31 Laſſis in febribus, circa articulos & maxillas præcipue, ABSCESSVS fiunt.

4.32 Quibus conualeſcentibus è morbis, pars aliqua laborauerit, illic ABSCESSVS fiunt.

4.51 In febribus ABSCESSVS, qui in primis iudicationibus non liberant, longitudinem morbi ſignificant.

4.74 Quibus ſpes eſt in articulis fore ABSCESSVM, liberat ab ABSCESSV urina multa,

craſſa, & alba facta, ut in laborioſis febribus quarto die incipit quibuſdam fieri: ſi uero & ex naribus fluxerit ſanguis, breui ad modum ſoluitur.

7.36 ABSCESSVS *exterior,) (interior.*
L. *Nephritici.*

ACCESSIONES.

1.11 *In* ACCESSIONIBVS *(à cibo) abſtinere oportet: ſiquidem (cibum) offerre nocet, & quicunq, (morbi) per circuitus* ACCESSIONES *habent, in* ACCESSIONIBVS *(à cibo) abſtinere oportet.*

1.12 ACCESSIONES *uero & conſtitutiones, declarabunt morbi & anni tēpora, & circuituum inter ſe incrementa, ſiue quotidie, ſiue alternis diebus, ſiue per longius tēpus fiant. ſed & ex ijs quæ mox apparent ut in pleuriticis ſputum ſi ſtatim appareat incipiente (morbo) (ipſum) breuem facit: ſi uero poſtea appareat, longum. urinæ etiam & alui excrementa et ſudores ubi ſuperuenerint, declarant morbos (fore) & difficilis & facilis iudicij, & breues & longos.*

1.19 *Iis qui in circuitibus* ACCESSIONES *habent, nihil (oportet) dare, neque cogere, ſed ſubtrahere ijs quæ offeruntur ante iudicationem.*

4.30 *Quibus* ACCESSIONES *fiunt, qua hora febris (eos) dimiſerit, ſi eadem hora ipſos occupauerit, difficilis (ſunt) iudicij.*

ACIDVS, A, VM.

6.33 *Qui* ACIDVM *ructum habent, non admodum pleuritici fiunt.*

1.24 In ACVTIS *morbis raro & in principijs, medicamentis purgantibus utendum (eſt); & hoc faciendum præmiſſo diligenti iudicio.*

2.19 ACVTORVM *morborum non omnino tutæ (ſunt) prædictiones neque ſalutis neque mortis.*

2.23 ACVTI *morbi in 14 diebus iudicantur.*

4.10 *Vtendum medicinis purgantibus in ualde* ACVTIS *morbis, ſi (materia) turget, eadem die; cunctari enim in talibus malum.*

5.30 *Mulierem grauidam* ACVTO *morbo corripi, letale.*

6.54 In ACVTIS *morbis qui cum febes exiſtunt, luctuoſæ reſpirationes, malum.*

7.1 In ACVTIS *morbis frigiditas extremarum partium, malum.*

7.32 *Quibus bilioſæ (ſunt nunc) ſubſidentiæ, quæ prius (fuerunt) tenues,* ACVTVM *morbum ſignificant.*

AEGRITVDO.

2.31 *Eius qui poſt* AEGRITVDINEM *bene cibatur corpus, nihil augeri, malum.*

AESTAS.

1.18 AESTATE *& autumno (ægri) cibos difficillime ferunt, hyeme facillime, uere ſecundo loco.*

2.25 AESTIVAE *quartanæ magna ex parte fiunt breues, autumnales uero longæ, præſertim quæ hyemem attingunt.*

3.6 *Quando* AESTAS *fuerit ueri ſimilis.ſudores in febribus expectare oportet.*

3.13 *Si* AESTAS *ſicca & aquilonia fuerit, autumnus autem pluuius & auſtralis, dolores capitis hyeme fiunt, & tuſſes & raucitates & grauedines; quibuſdam etiam phthiſes.*

3.18 AESTATE *uero & autumno aliquantiſper ſenes(optime degunt.) &c.*

3.21 AESTATE *autem aliqui(morbi)etiam ex ijs,(uernis uidelicet) & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ et uomitus, et diarrhœæ, & ophthalmiæ, & aurium dolores, & oris ulcerationes, & genitalium putredines, & ſudamina (accidunt).*

AESTVS.

7.13 *Poſt* AESTVS *uehementes conuulſio aut diſtentio malum.*

AETAS.

3.3 AETATES *quædam ad tempora & loca & uictus(bene aut male ſe habent.)*

3.24 *In* AETATIBVS *talia contingunt &c.* L. PVERI, PVERVLI, IVVENES, SENES.

3.30 *Iis qui hanc* AETATEM *(ideſt iuuentutem)exceſſerint, aſthmata, pleuritides, peripneumoniæ lethargi, phrenitides,(febres)ardẽtes, diarrhœæ lõgæ, choleræ, diſſenteriæ, liẽteriæ, hæmorrhoides(accidũt).*

6.57 *Apoplectici maxime fiunt* AETATE *ab annis quadraginta uſque ad ſexaginta.*

1.12 (*Alui*) *excrementa &c.*

2.14 IN ALVI *profluuijs mutationes excrementorum iuuant, niſi in praua commutentur.*

1.20 Q*uibus iuuenibus* ALVI *humidæ ſunt, ijs ſeneſcentibus ſiccãtur: quibus item iuuenibus* ALVI *ſunt ſiccæ, ijs ſeneſcentibus humectantur.*

2.53 Q*ui* ALVOS *humidas habent, (ij, quàm diu ſunt) iuuenes, melius degunt ſiccas habentibus: in ſenectute autem peius degunt; ſiccantur enim magna ex parte ſeneſcentibus.*

4.12. Q*uibus* ALVI *lienteria uexantur, (eos) hyeme per ſuperiora purgare malum (eſt).*

4.27 Q*uibus in febribus ſanguis alicunde large eruperit, ijs, cum reficiuntur,* ALVI *humectantur.*

4.60 ALVVS *exturbata ſoluit morbum.*

5.34 M*ulieri grauidæ ſi* ALVVS *nimis fluxerit, periculum eſt ne abortiat.*

AMARVS, A, VM.

4.17 AMARVM *os, medicamento per ſuperiora purgante indigere ſignificat.*

ANGINA.

5.10 Q*ui* ANGINAM *effugiunt, ad pulmonem ijs (malum) uertitur, et in ſeptem diebus pereunt: ſi uero hos effugerint, empyi fiunt.*

6.37 E*i qui ab* ANGINA *corripitur, ſi tumor factus fuerit in collo, bonum (eſt).* L. STRANGVLATIO.

7.49 E*i qui ab* ANGINA *corripitur, ſi tumor*

& rubor in pectore ſuperuenerint,bonū:extra enim uertitur ægritudo.

ANNVS.

3.15 IN ANNI *autem conſtitutionibus &c.* L. SICCITATES. L. VER, AESTAS, AVTVMNVS, HYEMS.

3.18 Per (ANNI *autem) tempora,uere quidem & prima æſtate pueri & qui eos ætate ſequuntur, optime degunt, & ualent maxime: æſtate uerò & autumno aliquantiſper ſenes: reliquo autem tempore hyemis (uidelicet), qui inter has ætates (id eſt) adoleſcentiam & ſenectutem,(ſunt) medii.*

6.45 Vl*cera* ANNVA. L. Vlcera.

ANXIETVDO.

7.56 ANXIETVDINEM, *oſcitationem, horrorem,uinum æquale æquali (aquæ mixtum) ſi bibatur,ſoluit morbum.*

APOPLEXIA.

2.42 Soluere APOPLEXIAM *fortem impoßibile (eſt), imbecillam uero non facile.*

6.56 Corporis APOPLEXIAM *&c.*

6.57 APOPLECTICI *maxime fient ætate ab nimis quadraginta uſque ad ſexaginta.*

7.40 Si *lingua repente infirma facta fuerit, aut* APOPLECTICA *facta fuerit aliqua pars corporis,melancholicum tale eſt.*

APOSTEMA .L. ABSCESSVS.

AQVA *calida & aqua frigida.* L. CALIDA. L. FRIGIDA.

5.26 AQVA *quæ cito caleſcit, & cito frige-ſcit leuiſsima eſt.*

7.42 *Si febris non ex bile nata ſit* AQVA *multa & calida capiti ſuperfuſa, ſolutio febris fit.*

7.55 *Quibus hepar* AQVA *repletum in omentum eruperit, iis uenter* AQVA *impletur, & moriuntur.*

AQVILONIVS, A, VM.

3.5 *Si uero* AQVILONIA *fuerit (conſtitutio,) tuſſes, fauces (aſperæ), alui duræ, dyſuriæ, horrores, dolores coſtarum & pectoris (fiunt) quando ta præualeat tempeſtas, talia in ægritudinibus expectare oportet.*

3.17 AQVILONIAE *autem conſtitutiones quæ quotidie fiunt, corpora cogunt, & robuſta & facile mobilia, & bene colorata, & melius audientia efficiunt, & aluos ſiccant, & oculos mordent; & ſi circa thoracem dolor aliquis præcedit, magis laborant.*

ARDENS.

6.26 *Quibus in* ARDENTIBVS *(febribus) tremores euenerint, ijs delirium ſuccedit.* L. *febris.*

AROMATA.

5.28 *Muliebria ducit ſuffitus* AROMATVM. *ſæpe uero & ad alia utilis eſſet, niſi capitis grauitatem induceret.*

ARS.

1.1 *Vita breuis,* ARS *longa.*

ARTICVLORVM DOLORES.

4.44 *Quibus (ſunt) febres longæ, ijs aut tubercu la, aut in* ARTICVLIS *dolores fiunt.*

4.45 *Quibus tubercula uel dolores in* ARTICVLIS *poſt febres longas fiunt, ij pluribus cibis utuntur.*

4.74 *Quibus ſpes eſt in* ARTICVLIS *fore abſceſſum.* L. ABSCESSVS.

5.15 ARTICVLORVM *tumores & dolo res ſine ulcere & podagricos etiam & conuulſiones, horum plurima, (aqua) multa frigida ſuperfuſa & mitigat & tenuat & dolorem ſoluit, torpor enim me diocris, dolorem ſoluendi uim habet.*

1.1 ASSIDENTES *&c.*

ASSVETVS, A, VM.

2.49 ASSVETI *ſolitos labores ferre, & ſi ſint imbecilles aut ſenes, non aſſuetis fortibusq́; & iu uenibus facilius ferunt.*

2.50 *Longo tempore* ASSVETA *etiam ſi de teriora ſint, minus quàm inſueta infeſtare conſueue runt: oportet itaque etiam ad inſueta tranſire.*

ASTHMA.

6.46 *Qui gibbi ex* ASTMATE *aut tuſsi fiũt ante pubertatem, moriuntur (cito).*

AVRES.

4.60 *Quibus in febribus* AVRES *obſurdue rint, ijs ſanguis ex naribus fluens aut aluus turbata morbum ſoluit.*

AVSTRI.

ATHLETAE. L. GIMNASTICI.

3.5 AVSTRI *auditum hebetant, caliginem (oculis) obducunt, capitis grauitatem efficiunt, pigros & languidos reddunt: quando ita præualeat tempeſtas, talia in ægritudinibus patiuntur. ſi uero aquilonia fuerit (constitutio), tuſſes, fauces (aſperæ) alui duræ, dyſuriæ, horrores, dolores coſtarum & pectoris (fiunt): quando ita præualeat tempeſtas, talia in ægritudinibus expectare oportet.*

3.17 AVSTRALES *autem (conſtitutiones) languida reddunt corpora & humectant, & grauitates auditus, & capitis, & uertiginem efficiunt, in oculis autem & corporibus difficilem motum exhibent, & aluos humectant.*

AVTVMNVS.

2.25 *Aeſtiuæ quartanæ magna ex parte breues fiunt,* AVTVMNALES *uero longæ, præſertim quæ hyemem attingunt.*

3.9 AVTVMNO *morbi acutisſimi atque exitioſiſsimi omnino (fiunt): uer autem ſaluberrimum & minime exitiale.*

3.10 AVTVMNVS *phthiſicis malus.*

3.13 *Si æſtas ſicca & aquilonia fuerit,* AVTVMNVS *uero pluuius & auſtrinus, dolores capitis hyeme fiunt, & tuſſes, & raucitates, & grauedines, quibuſdam uero etiam phthiſi.*

3.14 *Si uero* (AVTVMNVS) *aquilonius fuerit & ſiccus, iis qui natura humidi ſunt & mulieribus confert: reliquis uero ophthalmiæ ſiccæ aderunt & febres acutæ & longæ, quibuſdam uero etiam melan-*

res,conuulſiones,diſtentiones mitigat:capitisq; grauitatem ſoluit:plurimum autem & ante omnia cõfert oßibus fractis ſed præſertim denudatis, præterea iis maxime qui in capite ulcera habent, & iis partibus quæcunque præ frigore moriuntur;aut ulcerantur,& herpetibus exedentibus ſedi, pudendo,utero, ueſicæ. His calida (eſt) amica & iudicans,frigida uero inimica & interiment.

CALOR.

1.14 *Quæ creſcunt (corpora) plurimum habent* CALORIS *innati:plurimo igitur egent alimento; alioqui corpus abſumitur,ſenibus uero paucus (ineſt)* CALOR:*propterea paucis alimentis egent; a multis enim extinguitur:quare etiam febres ſenibus non ſimiliter acutæ fiunt,frigidum enim(eſt eorũ) corpus.*

4.39 *Et ubi in corpore* CALOR *aut frigus(eſt) ibi morbus(eſt).*

5.21 *Aliquando in diſtentione ſine ulcere iuueni, mediocri temperatura prædito æſtate media frigidæ multæ perfuſio,reuocationem* CALORIS *facit:* CALOR *aũt hæc liberat.* CALVVS,A,VM.

6.28 *Eunuchi podagra non laborant neque* CALVI *fiunt.*

CANCER.

6.38 *Quibus occulti* CANCRI *fiunt, eos non curare melius (eſt):qui enim curantur,pereunt celeriter;qui uero non curantur,longo tempore durant.*

CANIS.

4.5 *Sub* CANE *& ante* CANEM *difficilia*

ſunt purgantia medicamenta.

CAPILLI.

4.76 *Quibus in urina craſſa exiſtente carunculæ exiguæ aut ueluti* CAPILLI *unà exeunt, iis à renibus excernuntur.*

6.34 *Quibus* CAPILLI *defluxerunt iis uarices magni non fiunt: quibus uero* CAPILLIS *defluxis uarices ſucceſſerint, denuo iis* CAPILLI *naſcuntur.*

CAPVT.

4.70. *Quibus in febribus urinæ perturbatæ ſunt ueluti iumentorum, iis* CAPITIS *dolores uel adſunt uel aderunt.*

5.28 *Muliebres purgationes educit ſuffitus aromatum. ſæpe uero ad alia etiam utilis eſſet, niſi* CAPITIS *grauitatem induceret.*

5.64 *Lac dare iis quibus* CAPVT *dolet, malum. &c.*

5.68 *Si, ei cui pars* CAPITIS *poſterior doleat, recta in fronte uena ſecta fuerit, prodeſt.*

6.10 *Ei qui* CAPITE *laborat & multum dolet, ſi pus aut aqua, aut ſanguis fluxerit per nares, aut per os, aut per aures ſoluit morbum.*

6.51 *Quibus ſanis dolores in* CAPITE *repente fiunt, & ſtatim abmuteſcunt, & ſtertunt, moriuntur in ſeptem diebus, niſi febris (eos) inuaſerit.*

7.14 *Poſt ictum* CAPITIS *ſtupor aut deſipientia, malum:*

7.30 *Quibus ſpumoſa excrementa in diarrhœis*

(ſunt), iis à CAPITE phlegma defluit.

CARNOSVM

4.7 Ad uomitum difficiles & mediocriter CARNOSOS purgare (conuenit), cauentes æſtatem.

CARO.

7.2 Super oſſe ægrotante CARO liuida malum.

7.59. Corpibus humidas CARNES habentibus famẽ adhibere oportet: fames enim ſiccat corpora.

CARVNCVLA

4.76 Quibus in urina craſſa exiſtente CARVNCVLAE exiguæ aut ueluti capilli unà exeunt, iis à renibus excernuntur.

6.28 CASTRATI. L. EVNVCHI.

CATARRHVS.

7.38 CATARRHI in ſuperiorem uentrẽ (id eſt thoracem) ſuppurantur in diebus uiginti.

CEREBRVM.

6.18 CEREBRVM (diſciſſum) &c. letale.

6.50 Quibuſcunque CEREBRVM diſciſſum fuerit, iis neceſſe eſt febrẽ & bilis uomitũ ſuccedere.

7.50 Quibus corrumpi inceperit CEREBRVM, in tribus diebus moriuntur: ſi uero hos euâſerint, ſani fiunt.

7.58 Quibuſcunque CEREBRVM ex aliqua cauſa concuſſum fuerit, neceſſe eſt eos mutos repente fieri.

CHARTILAGO.

6.19 Cum os diſciſſum fuerit, aut CHARTILAGO, aut neruus, aut malæ tenuis particula, aut

præputium,neque augetur neque coaleſcit.

7.58 *Quodcũque os,aut* CHARTILAGO, *aut neruus,diſciſſus fuerit, neque augetur neque coaleſcit.*

CIBVS. L. VICTVS.

1.18 *Aeſtate & autumno* CIBOS *difficillime ferunt (ægri),hyeme facillime,uere ſecundo loco.*

2.8 *Si quis poſt morbum* CIBVM *capiens non corroboratur,ſignificat pluri* CIBO *corpus uti: ſi uero* CIBVM *non capiente id accidat,ſciendum eſt, quòd uacuatione indigeat.*

2.11 *Facilius eſt impleri potu quàm* CIBO.

2.17 *Vbi* CIBVS *magis præter naturam ingeſtus eſt, is morbum facit; declarat autem (ipſum) ſanatio.*

2.31 *Si cui poſt ægrotationem,* CIBVM *bene capienti,nihil augeatur corpus,malum.*

2.32 *Magna ex parte omnes qui male ſe habent,in principiis* CIBVM *bene capientes, & nihil proficientes,in fine rurſus* CIBVM *non appetunt: qui uero in principiis* CIBVM *uehementer abhorrent, poſtea autem bene* CIBVM *capiunt,melius degunt.*

4.13 *Corpora præhumectare* CIBO & *quiete.*

4.17 *Non febricitanti (ſi adſint)* CIBI *inappetentia & cordis dolor,& uertigo,& os amarum,per ſuperiora purgante medicamento indigere ſignificat.*

4.41 *Sudor multus ex ſomno ſine ulla alia cauſa eueniens,corpus uti pluri* CIBO *ſignificat: ſi uero*

CIBVM *non capienti id accidat,cum uacuatione egere ſignificat.*

4.45 *Quibus tubercula uel in articulis dolores poſt longas febres fiunt,ii pluribus* CIBIS *utuntur.*

5.61 *Si mulieri purgationes menſtruæ non exeant neque ſi horror neque febris ſucceſſerit,cibi autem faſtidia incidant,eam grauidam eſſe exiſtima.*

6.3 *In longis dyſenteriis* CIBI *auerſationes, malum; & ſi cum febre,peius.*

7.6 *Poſt morbum longum* CIBI *faſtidium & ſynceræ deiectiones,malum.*

7.62 *Si quis* CIBVM *febricitanti præbeat,ſano quidem robur,laboranti autem morbus.*

CICATRIX.

6.45 *Vlcera quæcunque annua fiunt,aut longiore tempore durant,neceſſe eſt (in iis)os abſcedere,&* CICATRICES *cauas fieri.*

COLLVM.

4.35 *Si febricitãti* COLLVM *repẽte peruertatur,& uix deglutire poßit,tumore in* COLLO *nõ exiſtente,letale.*

6.37 *Angina laboranti ſi tumor factus fuerit in* COLLO,*bonum.*

COLOR.

4.21 *Deiectiones nigræ ueluti ſanguis niger, ſua ſponte exeuntes & cũ febre & ſine febre,peßimæ; et quanto* COLORES *plures & peiores fuerint,tãto peius;cum medicamento autem purgante,melius (eſt) & quo plures fuerint* COLORES,*eo minus malũ*

5.46 *Quæ præter naturam craſſæ non* CONCIPIVNT *utero, iis omentum comprimit os uteri & priuſquàm extenuentur, non* CONCIPIVNT.

5.59 *Mulier ſi non* CONCIPIAT *in aluo, uelis autem ſcire an* CONCEPTVRA *ſit, obuoluens eam ueſtimentis ſuffi ab imo: & ſi tranſire tibi uideatur odor per corpus ad nares & ad os, ſcito ipſam non ex ſe ipſa eſſe ſterilem.*

5.62 *Quæ frigidos & denſos uteros haberet, non* CONCIPIVNT, *& quæ præhumidos habent uteros, non* CONCIPIVNT; *extinguitur enim in eis genitura, & quæ ualde ſuccos et efferueſcentes, defectu enim alimenti corrumpitur ſemen. quæ uero ex utriſque mediocrem habent temperaturam, tales fœcundæ fiunt.*

5.63 *Similiter uero & in maribus (euenit): aut enim propter corporis raritatem ſpiritus extra fertur, ita ut ſemen non emittatur; aut ob denſcitatem humor non abit foras; aut ab frigiditatem non accenditur, ut in eum locum congregetur; aut ob caliditatem illud idem euenit.*

CONCOCTVS, A, VM.

1.22 CONCOCTA *purgante medicamento uacuare, & mouere (oportet), non (ea quæ ſunt) cruda, neque* In *(morborum) principiis, niſi (humores) turgeant: ut plurimum uero non turgent.*

CONSIDERO.

6.52 CONSIDERARE autẽ oportet &c.

CONSTITVTIO.

3.15 *In anni autem* CONSTITVTIONIBVS,*in ſumma ſiccitates pluuijs ſunt ſalubriores et minus letales.*

CONVALESCENS.

4.32 *Quibus* CONVALESCENTIBVS *e morbis pars aliqua laborauerit, ibi abſceſſus fiunt.*

3.17 *Quotidianæ autẽ* CONSTITVTIONES,*aquiloniæ qoidem corpora cogunt, & robuſtiora, & expeditiora & coloratiora & melius audientia reddunt;præterea aluos exiccant, & oculos mordent,& ſi circa thoracem dolor aliquis præcedit magis laborant: auſtrales uero efficiunt corpora languida & humida,& aures hebetant,& capitis grauitates & uertigines mouent; in oculis autem & toto corpore difficilem motum (præbent), & aluos humectant.*

CONVVLSIO.

2.26 *Febrem* CONVVLSIONI *melius (eſt) ſuperueniſſe, quàm* CONVVLSIONEM *febri.*

4.57 *Ei qui* CONVVLSIONE *aut neruorum diſtentione affligitur,ſi febris ſuperuenerit,morbum ſoluit.*

4.66 *In febribus acutis* CONVVLSIONES,*& circa uiſcera dolores uehementes malum.*

4.67 *In febribus ex ſomnis pauores,aut* CON-

VVLSIONES,*malum.*

4.68 *In febribus ſpiratio offēdens,malum:* CON VVLSIONEM *enim ſignificat.*

5.1 CONVVLSIO *ex elleboro,letale.*

5.2 *Vulneri* CONVVLSIO *ſi ſuperuenerit, letale.*

5.3 *Sanguine multo fluente ſi* CONVVLSIO *aut ſingultus ſucceſſerit,malum.*

5.4 *Immodice purgationi* CONVVLSIO *aut ſingultus ſi ſucceſſerit malum.*

5.56 *Fluxui muliebri* CONVVLSIO *& animi defectus ſi ſuperueniant,malum.*

5.70 *Quia quartanis capiuntur,non admodum a* CONVVLSIONE *capiuntur:ſi uero capiantur prius,deinde ſuccedat quartana,liberantur.*

6.39 CONVVLSIO *fit uel a repletione uel ab inanitione:ſimiliter uero & ſingultus.*

6.56 *In melancholicis morbis ad has partes decubitus periculoſi (ſunt):aut apoplexiam corporis, aut* CONVVLSIONEM,*aut maniam, aut cæcitatem ſignificant.*

7.9 *Poſt ſanguinis fluxum deſipientia aut etiam* CONVVLSIO,*malum.*

7.10 *Poſt ileon uomitus,aut ſingultus,aut* CONVVLSIO,*aut deſipientia malum.*

7.13 *Poſt æſtus uehementes* CONVVLSIO, *aut diſtentio,malum.*

7.18 *Poſt uigiliam* CONVVLSIO *aut deſipientia,malum.*

7.25 Ex purgantis medicamenti potione CONVVLSIO,malum.

CONVVLSVS, A, VM.

5.5 Si ebrius repente aliquis obmutuerit CONVVLSVS moritur,niſi (eum) febris apprehenderit;aut ad horam perueniens,qua crapulæ ſoluuntur, locutus fuerit.

COR.

4.65 In febribus circa uentriculum æſtus uehemens & CORDIS morſus,malum.

6.18 COR (diſciſſum) &c.letale.

CORPVS.

2.7 Quæ longo tempore extenuantur CORPORA,(ea) lente reficere oportet.quæ uero breui,breuiter.(.i.celeriter.)

2.8 Pluri cibo CORPVS uel ſignificat. &c.

2.9 Impura CORPORA quo (magis) nutries,(eo) magis lædes.

2.10 CORPORA ubi quis purgare uult,oportet fluida facere.

2.37 Qui CORPORA habent commoderata (ijs) purgationes difficiles (fiunt).

2.28 Febricitantium non omnino leuiter CORPVS permanere,& nihil minui,uel etiam plus iuſto extenuari,malum:illud enim morbi longitudinem ſignificat;hoc uero imbecillitatem.

2.36 Sana habentes corpora,ſi p medicamēta purgātur,exoluūtur celeriter,& qui prauo cibo utūtur.

2.48 In omni motu CORPORIS,ubi (quis)

laborare cœperit, quieſcere, ſtatim laßitudinis remedium (eſt).

2.54 *Magnitudinem* CORPORIS *ineſſe iuuenibus, pulchrum eſt, neque indecens, ſenibus uero inutile, & peius, quàm ſi parui ſint.*

4.13 CORPORA *præhumectare pluri cibo et quiete.*

4.14 *Indicat autẽ nauigatio, quòd motus* CORPORA *turbat.*

4.15 *Vbi uelis magis ducere elleborum, moue* CORPVS, *ubi uero ſiſtere, ſomnum fac, & ne moue.* L. ELLEBORVS.

4.38 *Et ubi ineſt in* CORPORE *ſudor, ibi morbum nunciat.*

4.39 *Et ubi ineſt in* CORPORE *(notabilis) calor aut frigus, ibi morbus (eſt).*

4.40 *Et ubi in toto* CORPORE *mutationes (fiunt) & modo* CORPVS *frigeſcat, modo caleſcat, aut calor alius ab alio fiat, longitudinem morbi ſignificant.*

7.59 CORPORIBVS *humidas carnes habentibus famem oportet adhibere: fames enim ſiccat* CORPORA.

7.66 CORPORA *ubi quis purgare uult, fluida facere oportet: & ſi quidem per ſuperiora, aluum ſiſtere; ſi uero per inferiora humectare.*

CORRVPTIO. σφακελισμὸς

7.73 *Poſt* CORRVPTIONEM, *abſceſſus oßis (ſuccedit).*

COXA.

6.59 Quibus à COXAE morbo longo uexatis exilit coxa & rurſus incidit, ijs (in ea parte) mucores innaſcuntur.

6.60 Quibus à COXAE morbo longo uexatis coxa exilit, ijs crus eliqueſcit, & claudicat, niſi (ij) uſti fuerint.

CRASSVS, A, VM.

2.44 Natura ualde CRASSI citius uitam obeunt quàm graciles.

5.46 Quæ (mulieres) præter naturam CRASSAE non concipiunt utero, ijs omentum deprimit os uteri & ante quàm extenuentur, non concipiunt.

CRESCO.

1.14 Quæ CRESCVNT (corpora), plurimũ habent caloris innati: plurimo igitur egent alimento, alioqui corpus abſumitur. ſenibus uero paucus ineſt calor: propterea paucis alimentis egent; à multis enim extinguitur. quare etiam febres ſenibus non ſimiliter acutæ (fiunt): frigidum enim (eſt eorum) corpus.

CRISIS. I. IVDICATIO, ET IVDICIVM.

2.12 Quæ poſt CRISIM in morbis relinquuntur, recidiuas facere conſueuerunt.

2.13 Quibus CRISIS ſit, ijs nox quæ acceßionem præcedit, difficilis eſt: quæ uero ſubſequitur, ut plurimum facilior (eſt).

CVTIS.

5.71 Quibus CVTES obtenduntur aridæ &

ſiccæ,ſine ſudore moriuntur;quibus uero laxæ & raræ,cum ſudore moriuntur.

DEBILIS. L. IMBECILLVS.

DEIECTIO. L. EXCREMENTA. ET L. EVACVATIONES. & L. PVRGATIO.

4.21 DEIECTIONES *nigræ ueluti ſanguis niger,ſua ſponte exeuntes & cum febre & ſine febre peßimæ:& quanto colores plures & peiores fuerint, tanto peius:cum medicamento autem purgante melius eſt.& quanto colores plures fuerint eo minus malum.*

4.26 *Si dyſenteria laboranti ueluti carnes per inferiora exierint letale.*

4.28 *Quibus bilioſæ* DEIECTIONES*(sũt) (ijs)ſurditate ſuperueniẽte ceſſant:& quibus(eſt)ſurditas, (ijs bilioſis* DEIECTIONIBVS *ſuperuenientibus ceſſat.*

7.6 *Poſt longum morbum cibi faſtidium & ſinceræ* DEIECTIONES*,malum.*

7.23 *Poſt ſinceram* DEIECTIONEM *dyſenteria(ſequitur).*

DELIRIVM. L. DESIPIENTIA.

2.2 *Vbi ſomnus* DELIRIVM *ſedauerit,bonũ.*

4.50 *Vbi in febre non intermittente difficultas ſpirandi &* DELIRIVM *accidit,letale.*

DENTES.

4.53 *Quibus circa* DENTES *in febribus lentores fiunt, (iis) uehementiores febres fiunt.*

DENTITIO.

3.25 Iis qui ad DENTITIONEM acceduͤt, gingiuarum pruritus (fiunt), febres, cõuulſiones, diarrhœæ, & maxime cũ edunt caninos dentes & iis pueris qui ſunt craſſiſſimi, & aluos duras habent.

DESIPIENTIA.

6.53 DESIPIENTIAE quæ cum riſu fiuͤt, tutiores; quæ uero ſerio, periculoſiores.

7.7 Ex multa potione (uini,) rigor aut DESIPIENTIA, malum.

7.9 Poſt ſanguinis fluxũ DESIPIENTIA, aut etiam conuulſio, malum.

7.10 Poſt ileon DESIPIENTIA, malum.

7.14 Poſt ictũ capitis ſtupor aut DESIPIENTIA, malum.

7.18 Poſt uigiliam conuulſio aut DESIPIENTIA, malum.

7.24 In oſſis capitis ſciſſione DESIPIENTIA (fit), ſi uacuum apprehenderit.

DIARIA FEBRIS.

4.55 In bubonibus febres omnes malæ, præter DIARIAS.

DIARRHOEA.

6.15 Longa DIARRHOEA laboranti ubi ſua ſponte uomitus ſucceſſerit, ſoluit DIARRHOEAM.

6.16 Pleuritide aut peripneumonia laboranti DIARRHOEA ſi ſucceſſerit, malum.

6.17 Lippientem DIARROEA correptũ eſſe

bonum (eſt).

5.32 *Balbi à* DIARRHOEA *longâ maximè capiuntur.*

7.29 *Si ei qui phlegmate albo detinetur,* DIARRHOEA *uehemens ſucceſſerit, ſoluit morbum.*

7.30 *Quibus ſpumoſa excrementa in* DIARRHOEIS *(ſunt), ijs à capite phlegma defluit.*

7.71 DIARRHOEAE *dyſenteria (ſuccedit).*

DIES.

2.24 (DIEI) *ſeptimi quartus (eſt) index, alterius ſeptimanæ octauus (eſt) principium: contemplabilis uero (eſt) undecimus; hic enim eſt quartus alterius ſeptimanæ: contemplabilis rurſus (eſt) decimus ſeptimus; hic enim eſt quartus à quartodecimo, ſeptimus autem ab undecimo.*

DISTENTIO. L: CONVVLSIO.

5.6 *Qui à* DISTENTIONE *capiuntur, in quatuor diebus pereunt: ſi uero hos effugerint, ſani fiunt.*

5.21 *aliquando in* DISTENTIONE *ſine ulcere iuueni mediocri temperatura prædito, æſtate frigidæ multæ perfuſio, reuocationem caloris facit: calor autem hæc liberat.*

7.13 *Poſt æſtus uehementes conuulſio aut* DISTENTIO, *malum.*

DOLEO. DOLOR. L. CAPVT.

2.6 *Quicunque* DOLENTES *parte aliqua corporis, omnino* DOLORES *non ſentiunt, ijs mens ægrotat.*

Sed

4.33 *Sed ſi (cui) etiam pars quadam* DOLVERIT, *prius quàm ægrotet, ibi firmatur morbus.*

2.46 *Si duo* DOLORES *ſimul eueniant, non in eodem (tamen) loco, uehementior alterum obſcurat.*

4.11 *Quibus (sũt)* DOLORES *inteſtinorũ & circa umbilicum labores & lumborum angor qui non ſoluatur neque a purganti medicamento neque aliter, in hydropem ſiccam firmatur.*

4.18 DOLORES *ſupra ſeptum tranſuerſum, quicunque purgatione egent, medicamento quod per ſuperiora purget, indigere ſignificant: quicunque autem infra, per inferiora.*

6.5 DOLORES *& in lateribus & in pectore & in alijs partibus nũ ualde præſtent, perdiſcẽdũ eſt.*

6.7 DOLORES *& tumores, qui in uentre fiũt, ſublimes leuiores, non ſublimes uehementiores.*

6.10 *Ei qui capite laborat & multum* DOLET, *ſi pus aut aqua aut ſanguis fluxerit per nares aut per os aut per aures, ſoluit morbum.*

6.22 *Quicunque ex ruptionibus* DOLORES *à dorſo ad cubitus deſcendunt, eos uenæ ſectio ſoluit.*

6.31 DOLORES *oculorum meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut uenæ ſectio, aut medicamentum purgans ſoluit.*

6.40 *Quibus circa hypochõdrium* DOLOR *fit ſine inflammatione, ijs febris ſuccedens ſoluit* DOLOREM.

7.22 *Poſt longum uentris* DOLOREM, *ſuppuratio (fit).*

7.26 Poſt DOLOREM *uentris uehementem, extremarum partium frigiditas, malum.*

EDVCO. L. *ago, uel traho, ſeu purgo.*

1.21 *Quæ* EDVCENDA *ſunt, quo maxime trahit natura, eò per conferentia loca* EDVCERE *oportet.*

7.5 ΕΚΣΤΑΣΙΣ. *ideſt mentis alienatio.* L. MENS.

DYSENTERIA.

4.24 DYSENTERIA *ſi ab atra bile inceperit, letalis eſt.*

4.26 *Si ei qui* DYSENTERIA *laborat, deiectiones ueluti carnes exierint, letale eſt.*

6.3 *In longis* DYSENTERIIS *cibi auerſationes, malum; & ſi cum febre peius.*

6.43 *Quicunque lienoſi à* DYSENTERIA *corripiuntur; iis ſuperueniente longa* DYSENTERIA, *uel hydrops ſuccedit, uel lienteria, & moriuntur.*

6.48 *Lienoſis* DYSENTERIA *ſi ſucceſſerit, bonum.*

7.5 *Poſt maniam,* DYSENTERIA, *aut hydrops, aut mentis alienatio, bonum.*

7.23 *Poſt ſinceram deiectionem* DYSENTERIA *(ſequitur).*

7.71 *Diarrhœæ* DYSENTERIA *(ſuccedit).*

7.72 DYSENTERIAE *lienteria ſuccedit.*

DYSVRIA.

6.36 DYSVRIAM *uenæ ſectio ſoluit: inciden*

dæ autem ſunt(uenæ)interiores.

7.48 *Stranguriam & DYSVRIAM uini potio & ſanguinis miſsio ſoluunt:incidere autem internas uenas oportet.*

EBRIVS.

5.5 *Si EBRIVS quiſpiam repente obmutuerit, conuulſus moritur,niſi (eum) febris arripiat, aut ad eam perueniens horam,qua crapulæ ſoluentur,uocem proferat.*

ELLEBORVS.

4.13 *Ad ELLEBOROS ſumendos ijs qui nõ facile per ſuperiora purgantur, (oportet) præhumectare corpora pluri cibo & quiete.*

4.14 *Cum biberit quis ELLEBORVM, ad motus quidem corporum magis ducere (ipſum oportet),ad ſomnos uero & quietes minus, indicat autem nauigatio,metum turbare corpora.*

4.15 *Vbi uelis magis ducere ELLEBORVM, corpus moue; ubi uero ſiſtere, ſomnum fac, & ne moue.*

4.16 *ELLEBORVS periculoſus (eſt) carnes ſanas habentibus:conuulſionem enim inducit.*

5.1 *Conuulſio ex ELLEBORO,letale.*

EMMOTON. *L.medicamentũ liquidum,quod linamentis excipitur,& ulceribus inditur.linamenta enim ſeu linteola* μοτὰ *Græcis uocantur.*

5.47 *Si uterus qua parte coxæ incumbit, ſuppurauerit,neceſſe eſt EMMOTON factum eſſe.*

EMPYEMA. L. *ſuppuratio.*

5.8 *Quicunque pleuritici facti, in* xiiij *diebus per ſuperiora non purgantur, ijs(malum) in* EMPYEMA *tranſmutatur.*

EMPYVS, A, VM. L. *ſuppuratus, a, um.*

5.10 *Qui anginam effugiunt, ad pulmonem iis (malum) uertitur, & in ſeptem diebus pereunt, ſi uero hos effugerint,* EMPYI *fiunt.*

5.15 *Qui ex pleuritide* EMPYI *fiunt, ſi per ſuperiora purgantur, in* 40 *diebus, ex quo ruptio facta fuerit, conualeſcunt; ſi uero non, in phthiſin tranſeunt.*

6.17 *Quicunque* EMPYI *aut hydropici uruntur aut inciduntur, ſi pus aut aqua confertim effluxerit, omnino moriuntur.*

7.44 *Quicunque* EMPYI *uruntur aut inciduntur, ſi pus fluxerit purum & album, euadunt; ſi uero ſubcruentum, feculentum & fœtidum, moriuntur.*

EPILEPSIA.

5.7 EPILEPSIAE *quibuſcunque ante pubertatem eueniunt, mutationem capiunt: quibuſcunque autem* XXV. *anno eueniunt, cum iis magna ex parte commoriuntur.*

EPILEPTICVS, A, VM.

2.45 EPILEPTICOS *pueros liberant mutationes maxime ætatis & locorum & uictuum.*

ERYSIPELAS.

5.43 *Si mulieri grauidæ* ERYSIPELAS *in utero factum fuerit, letale.*

6.25 ERYSIPELAS *a partibus exteriori-*

bus effuſum ad interiores uerti, non bonum, ab interioribus autem ad exteriores, bonum.

7.19 *Poſt oßis denudationem* ERYSIPELAS, *(malum).*

7.20 *Poſt* ERYSIPELAS *putredo & ſuppuratio, malum.*

EVACVATIO.

1.2 *Sic uero etiam uaſorum* EVACVATIO, *ſi qualis oportet fieri, fiat, confert & leuiter ſe habēt (ægri) ſin minus, contra &c.*

1.3 *ſimiliter uero &* EVACVATIONES *quæ ad extremum agunt, periculoſæ. &c.*

1.23 *Quæ* EVACVANTVR, *nō multitudine ſunt æſtimanda, ſed quòd qualia (*EVACVARI*) oportet,* EVACVANTVR, *& (æger) facile toleratat: atque ubi uſque ad animi defectum educere oportet, etiam hoc faciendum eſt, ſi æger pertulerit.*

EVNVCHVS.

6.28 EVNVCHI *neque podagra laborant neque calui fiunt.*

EXANTHEMATA,

6.9 *Lata* EXANTHEMATA *non ualde pruriunt.*

EXCERNO.

7.63 *Quæ per ueſicā* EXCERNVNTVR *inſpicere oportet, num (talia ſunt) qualia ſanis* EXCERNVNTVR. *Quæ igitur ijs minime ſimilia, hoc morboſiora: quæ uero ſimiliora ſanis, minime morboſa.*

4.47 EXCREATIONES *in febribus non deficientibus liuidæ, cruentæ, & fœtidæ, & bilioſæ, omnes malæ: at quæ bene exeunt, bonæ, tum per deiectiones, tum per urinas. ſi uero nihil eorum quæ conferunt per hæc loca excernatur, malum.*

7.65 EXCREATIONES *in febribus non intermittentibus liuidæ, & cruentæ, & bilioſæ, & fœtidæ, omnes malæ: at quæ bene exeunt, bonæ, tum per uentrem, tum per ueſicam: & ubi aliquid quod excernitur, ſteterit non purgatum, malum.*

EXCREMENTVM. EXCRETIO.

2.14 *In alui profluuijs mutationes* EXCREMENTORVM *iuuãt, niſi in prauas cõmutẽtur.*

2.15 *Vbi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore naſcuntur,* EXCRETIONES *conſiderare oportet: nam ſi bilioſæ fuerint, corpus unà ægrotat; ſi uero ſimiles ſanis fiant, alere corpus tutum eſt.*

2.18 *Eorum quæ confertim & celeriter alunt, celeres etiam fiunt* EXCRETIONES.

7.30 *Quibus ſpumoſa* EXCREMENTA *in diarrhœis (ſunt), ijs a capite phlegma defluit.*

7.65 *Et quibus* EXCREMENTA *ſi ſtare permiſeris, & non moueris, ſubſiſtunt ueluti ſtrigmenta: & ſi pauca fuerint exiguus morbus fit; ſi multa, multus. his confert ſubpurgare aluum. ſi uero non purgata (aluo), dederis ſorbitiones, lædes; & quo plures dederis, (eo) magis lædes.*

7.75 *Qualia etiam in* EXCREMENTIS

quæ fiunt per ueſicam, & per aluum, & per carnes, et ſicubi aliter à natura corpus exceſſerit, ſi parum paruus morbus fit; ſi multum multus; ſi permultum id letale eſt.

EXERCITATORES. L. GYMNASTICI.

1.3 *In* EXERCITATORIBVS *(id eſt athletis) ſumme firmæ ualetudines, periculoſæ ſi in extremo fuerint: non enim poſſunt &c.*

EXOLVOR.

2.41 *Qui* EXOLVVNTVR *ſæpe & ualide ſine manifeſta cauſa, ij quàm primum moriuntur.*

EXCREMENTVM.

1.1 EXCREMENTVM *periculoſum. etc.*

EXTENVATIO.

1.3 *Neque uero* EXTENVATIONES *ad extremum ducere &c.*

EXTENVOR.

2.7 *Quæ longo tempore* EXTENVANTVR *corpora, (ca)lente reficere oportet: quæ uero breui, celeriter.*

EXTERIOR.

1.1 *Oportet autem non ſolum (medicum) ſe ipſum præſtare ut ea quæ oportet, faciat, ſed & ægrum & aſsidentes &* EXTERIORA.

4.48 *In deficientibus febribus ſi* EXTERIORES *partes frigidæ fuerint, interiores uero urantur, & ſitim habent (æger), lætale.*

6.25 *Eryſipelas a partibus* EXTERIORI-

BVS *effuſum, ad interiores uerti, non bonum; ab interioribus autem ad* EXTERIORES, *bonum.*

EXTREMVS, A, VM.

1.6 *Ad* EXTREMOS *autem morbos,* EXTREMAE *cum diligẽtia curationes optimæ (ſunt).*

7.1 *In acutis morbis frigiditas* EXTREMARVM *partium, malum.*

7.26 *In uehementi uentris dolore* EXTREMArum *partium frigiditas, malum.*

FAMES.

2.4 *Non repletio, non* FAMES, *neque aliud quicquam bonum (eſt), quod nimium a natura diſceſſerit.*

2.16 *Vbi* FAMES, *non oportet laborare.*

2.21 FAMEM, *uini (uinoſi) potio ſoluit.*

7.59 *Corporibus humidas carnes habentibus* FAMEM *oportet adhibere, fames enim corpora ſiccat.*

FAVCES.

Vbi FAVCES *ægrotant, aut tubercula in corpore naſcuntur, excretiones conſiderare oportet: ſi enim bilioſæ fuerint, corpus una ægrotat; ſi uero ſanis ſimiles fiant, tutum eſt corpus nutrire.*

FEBRIS. FEBRICITANS.

1.14 *Quare etiam* FEBRES *ſenibus non ſimiliter acutæ (ſiunt): frigidum enim (eſt eorum) corpus.*

2.25 (FEBRES) *æſtiuæ quartanæ magna ex parte fiunt breues, autumnales uero longæ, & præcipue quæ hyemem attingunt.*

2.26 FEBREM *conuulſioni melius eſt ſuperueniſſe, quàm conuulſionem febri.*

2.28 FEBRICITANTIVM *non omnino leuiter, corpus permanere, & nihil minui uel etiam plus iuſto extenuari, malum: illud enim morbi longitudinem ſignificat, hoc uero imbecillitatem.*

3.6 *Quando æſtas fuerit ueri ſimilis, ſudores in* FEBRIBVS *expectare oportet.*

3.7 *In ſiccitatibus* FEBRES *acutæ fiunt. & ſi quidem maiori ex parte annus talis extiterit, qualem fecit conſtitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet.*

4.17 *Non* FEBRICITANTI *(ſi adſint) cibi abſtinentia, & cordis morſus, & uertigo, & os amarum, medicamento per ſuperiora purgante opus eſſe ſignificant.*

4.20 *Non* FEBICITANTIBVS *ſi acciderit inteſtinorum dolor, & genuum grauitas, & lumborum angor, medicamento per inferiora purgante opus eſſe ſignificant.*

4.27 *Quibus in* FEBRIBVS *ſanguinis multitudo alicunde eruperit, ijs, dum reficiuntur, alui humectantur.*

4.29 *Quibus in* FEBRIBVS *ſextum diem agentibus rigores fiunt, difficilis (ſunt) iudicij.*

4.30 *Quibus* FEBRIS *acceſſiones fiunt, quacunque hora (eos) febris dimiſerit, poſtero die eadem hora ſi inuaſerit, difficilis (ſunt) iudicij.*

4.34 *Si* FEBRICITANTI *tumore non exiſtente in faucibus, ſtrangulatio ſtatim ſuperuener., letale.*

4.35 SI FEBRICITANTI *collum repente peruentitur, & uix deglutire poſsit, tumore in collo non apparente, letale (eſt).*

4.36 *Sudores* FEBRICITANTIBVS *ſi inceperint, boni tertio (die), & quinto, & ſeptimo, & nono, & undecimo, & quartodecimo, & decimoſeptimo, & uigeſimo primo, & uigeſimo ſeptimo & trigeſimo primo, & trigeſimo quarto. ii enim ſudores morbum iudicant: qui autem non ſic eueniunt, laborem ſignificant & longitudinem morbi, & recidiuam.*

4.37 *frigidi ſudores cum acuta* FEBRE *ſi eueniant, mortem ſignificant, cum mitiore autem, morbi longitudinem.*

4.43 FEBRES *quæcunque non intermittentes tertio die fortiores fiunt, periculoſæ: quoque autem modo intermiſerint, uacare periculo ſignificant.*

4.44 *Quibus (adſunt)* FEBRES *longæ, iis tubercula, aut dolores circa articulos fiunt.*

4.45 *Quibus tubercula aut circa articulos dolores poſt* FEBRES *longas fiunt, ii cibis pluribus utuntur.*

4.46 *Si rigor incidit* FEBRE *non deſinente, ægro iam imbecillo, letale.*

4.47 *Excreationes in* FEBRIBVS *non intermittentibus liuidæ, & cruentæ, & fœtidæ, & biliosæ omnes malæ. quæ ſi bene excernuntur, bonæ (ſunt) & per deiectiones & per urinas: ſi uero nihil eorum quæ conferunt, per hæc loca excernun-*

tur, malum.

4.48 *In non intermittentibus* FEBRIBVS *ſi (ægro) exteriores partes frigidæ fuerint, interiores autem urantur, & ſitim habeat, letale (eſt).*

4.49 *In* FEBRE *non intermittente ſi labrum, aut, ſupercilium aut oculus, aut naſus peruertatur, ſi (æger) non uideat, ſi non audiat, iam imbecillo exiſtente corpore, quicquid horum acciderit, in propinquo eſt mors.*

4.50 *Vbi in* FEBRE *non deficiente ſpirandi difficultas & delirium acciderit, letale (eſt).*

4.51 *In febribus abſceſſus ſi non ſoluuntur in primis iudicationibus, longitudinem morbi ſignificant.*

4.52 *Qui in* FEBRIBVS *aut in aliis morbis ex uoluntate lacrymant, nihil abſurdum (eſt); qui uero non ex uoluntate, abſurdius.*

4.53 *Quibus iuxta dentes in* FEBRIBVS *lentores fiunt, (ijs) uehementiores fiunt febres.*

4.54 *Quibus diu (durant) tuſſes ſiccæ breui irritantes in* FEBRIBVS *ardentibus, (ij) non admodum ſiticuloſi exiſtunt.*

4.55 *In bubonibus* FEBRES *omnes malæ, præter ephemeras.*

4.56 FEBRICITANTI *ſudor ſuperueniẽs febre non deficiente, malum. producitur enim morbus, & humiditatem ampliorem ſignificat.*

4.57 *Ei qui conuulſione aut diſtentione uexatur, ſi febris ſucceſſerit, ſoluit morbum.*

4.58 FEBRE *ardente correpto, rigore ſuper-*

ueniente(fit) ſolutio.

4.59 (FEBRIS) *tertiana exquiſita in ſeptem circuitibus, cum tardiſſime, iudicatur.*

4.60 *Quibus in* FEBRIBVS *aures obſurduerint, (ijs) ſanguis e naribus fluens, aut aluus turbata morbum ſoluit.*

4.61 FEBRICITANTEM *niſi inparibus diebus* FEBRIS *dimiſerit, (ea) redire ſolet.*

4.62 *Quibus in* FEBRIBVS *morbus regius ante ſeptimum diem ſuccedit, malum.*

4.63 *Quibus in* FEBRIBVS *quotidie rigores eueniant, (ijs) quotidie* FEBRES *ſoluuntur.*

4.64 *Quibus in* FEBRIBVS *ſeptimo uel nono uel undecimo uel quartodecimo morbus regius ſucceſſerit, bonum (eſt), niſi dextrum hypochondrium durum fuerit: ſi uero non, malum (eſt), non bonum.*

4.65 *In* FEBRIBVS *circa uentriculum æſtus uehemens & cordis morſus, malum.*

4.66 *In* FEBRIBVS *acutis conuulſiones & uehementes uiſcerum dolores, malum.*

4.67 *In* FEBRIBVS *ex ſomnis pauores aut conuulſiones, malum.*

4.68 *In* FEBRIBVS *ſpiratio offendens, malũ: conuulſionem enim ſignificat.*

4.69 *Quibus (ſunt) urinæ craſſæ, grumoſæ, paucæ, non ſine* FEBRE *exiſtentibus, ſi multitudo ex ijs ad uenerit tenuis, iuuat: præcipue autem tales ab initio exeunt, aut breui ſedimen obtinent.*

4.70 *Quibus in* FEBRIBVS *urinæ perturba*

tæ(ſunt)ueluti iumenti alicuius,ijs capitis dolores uel adſunt uel aderunt.

4.71 Q*uibus(in* F E B R I B V S *die)ſeptimo iudicium fit,ijs nubeculam obtinet urina quarto die rubram,& alia,ſecundum rationem.*

4.72 Q*uibus(in* F E B R I B V S*)urinæ perſpicuæ (&) albæ, malæ, præcipue autem ſi in phreniticis appareant.*

4.73 Q*uibus hypochondria eleuata murmurant lumborum dolore ſuccedente,alui ijs humectantur,niſi flatus erumpant aut urinæ multitudo exeat.in* F E B R I B V S *autem hæc(accidunt).*

4.74 Q*uibus ſpes eſt in articulis fore abſceſſum, liberat ab abſceſſu urina multa,craſſa,& alba facta,ut in laborioſis* F E B R I B V S*,quarto die incipit quibuſdam fieri;ſi uero & ex naribus fluxerit ſanguis, breui ad modum ſoluitur.*

5.55 Q*uæcunque(mulieres)grauidæ a* F E B R I B V S *corripiuntur,& uehementer extenuantur ſine cauſa manifeſta,(eæ)ægre & periculoſe pariunt, aut abortientes periclitantur.*

5.64 L*ac dare ijs quibus caput dolet,malum; malum item* F E B R I C I T A N T I B V S*, & quibus hypochondria eleuata murmurant;& ſitibundis malum etiam quibus (ſunt)illioſæ deiectiones in acutis* F E B R I B V S*,& quibus ſanguinis multi deiectio facta eſt.congruit autem phthiſicis qui non adeo multum* F E B R I C I T E N T*:dare etiam in* F E B R I B V S *longis,leuibus, ſi nullum prædictorum ſigno=*

rum affuerit; & præter rationem extenuatur.

6.26 *Quibus in ardentibus* (FEBRIBVS) *tremores fiunt, iis delirium ſuccedit.*

6.40 *Quibus circa hypochondrium dolor fit ſine inflammatione, iis* FEBRIS *ſuccedens ſoluit dolorẽ.*

6.44 *Quibus poſt ſtranguriam ileos ſuccedit, in ſeptem diebus moriuntur, niſi* FEBRE *ſubſecuta, ſatis urina fluxerit.*

6.50 *Quibuſcunque cerebrum diſciſſum fuerit, iis neceſſe eſt* FEBREM *& bilis uomitum ſuccedere.*

6.51 *Quibus ſanis dolores fiunt repente in capite & ſtatim obmuteſcunt, & ſtertunt, moriuntur in ſeptem diebus, niſi (eos)* FEBRIS *apprehenderit.*

6.54 *In acutis morbis qui cum* FEBRE *(exiſtunt), luctuoſæ reſpirationes, malum.*

7.31 *Quibuſcunque* FEBRICITANTIBVS *in urinis ueluti farinæ craſſæ, ſubſidentiæ fiunt, longam ægritudinem (fore) ſignificant.*

7.37 *Quicunque ſanguinem uomunt, ſi ſine* FEBRE *ſalubre (eſt), ſi uero cum febre, malum. curare autem (ipſum oportet) adſtringentibus & refrigerantibus.*

7.42 *Si* FEBRIS *non a bile (ortum) habeat, aqua multa & calida capiti infuſa, ſolutio febris fit.*

7.52 *Quibus hepar uehementer dolet, iis ſi* FEBRIS *ſuperuenerit, ſoluit dolorem.*

7.62 *Si quis* FEBRICITANTIBVS *cibum præbeat, (ut) ſano robur, (ſic) laboranti morbus.*

FLATVOSVS, A, VM.

5.72 Biles flaua abundantes non admodum flatuoſi ſunt.

FLVOR. L. DIARRHOEA.

5.56 FLVORI muliebri ſi conuulſio & animi defectus ſucceſſerit, malum.

2.10 FLVIDVS, A, VM.

7.66 corpora ubi quis purgare uult, oportet FLVIDA facere.

5.62 FOECVNDVS, A, VM. L. MVLIER.

FOETVS.

5.31 Mulieri grauida ſanguine miſſo abortit, idque magis ſi FOETVS maior fuerit.

5.48 FOETVS mares in dextris partibus, fœminæ in ſiniſtris magis (continentur.)

5.53 Quæ (mulieres) diſperſuræ ſunt FOETVS, iis mammæ tenues fiunt: ſi uero contra, duræ factæ fuerint, dolor erit uel in mammis, uel in coxis uel in genibus, uel in oculis, & non diſperdent.

5.52 Mulieri grauidæ ſi lac e mammis plurimnm effluat, imbecillum FOETVM ſignificat: ſi uero ſolidæ mammæ fuerint, ſaniorē FOETVM ſignificant.

5.60 Si mulieri grauidæ purgationes exeant, impoßibile eſt FOETVM eſſe ſanum.

FRIGEFACIO.

5.19 Quæ FRIGEFACTA ſunt, ea excalefacere oportet, præter ea quæ ſanguinem profundunt, aut profuſura ea ſunt.

FRIGESCO.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

5.26 *Aqua quæ cito caleſcit & frigeſcit leuiſſima (eſt).*

FRIGIDITAS.

7.1 *In acutis morbis* FRIGIDITAS *extremarum partium malum.*

FRIGIDVS,A,VM.

5.17 FRIGIDA *autem (aqua) conuulſiones, diſtẽtiones, denigrationes & rigores febriles efficit.*

5.18 *(Aqua)* FRIGIDA *inimica (eſt) oſſibus, dentibus, neruis, cerebro, ſpinali medullæ; calida uero utilis.*

5.20 *Vlceribus* FRIGIDA *mordax; cutem obdurat, dolorem inſuppurabilem facit, denigrat, rigores febriles facit, (item) conuulſiones, et diſtentiones.*

5.21 *Nonnunquam in diſtentione ſine ulcere iuueni mediocri temperatura prædito, æſtate media* FRIFIDAE *multæ perfuſio, reuocationem caloris facit: calor autem hæc liberat.*

5.23 *In iis (partibus) oportet* FRIGDA *uti, unde fluit ſanguis aut fluxurus eſt, non ſuper ipſas (partes), ſed iuxta eas, unde eff uit: & quæcunque inflammationes aut efferueſcentiæ ad rubrum & ſubcruentum uergentes, recenti ſanguine ſuper has, nam ueteres denigrat: item (ſuper) eryſipelas non ulceratum, nam ulceratum lædit.*

5.24 FRIGIDA, *ut nix & glacies pectori (ſunt) inimica, tuſſes mouent, ſanguinis fluxum efficiunt, & catarrhos excitant.*

5.25 *In articulis tumores & dolores ſine ulcere, & po-*

& podagricos(etiam), & conuulſiones, horum pluri-mos FRIGIDA *multa ſuperfuſa leuatque & mi-nuit, & dolorem ſoluit: ſtupor autem mediocris dolo-rem ſoluit.*

FVRFVREVS, A, VM.

4.77 *Quibus in urina craſſa* FVRFVREA *ſimul eminguntur, ijs ueſica ſcabie laborat.*

FVROR. L. MANIA.

GENV.

4.20 *Non febricitantibus ſi acciderit inteſtino-rum dolor, &* GENVVM *grauitas & lumbo-rum angor: medicamento per inferiora purgante opus eſſe ſignificant.*

GIBBVS, A, VM.

6.46 *Qui* GIBBI *ex aſthmate aut tuſſi fiunt ante pubertatem, moriuntur.*

GLABER, A, VM.

6.4 *Glabra undiquaque ulcera, maligna(ſunt).*

GRACILIS, E.

4.6 GRACILES *& ad uomitum faciles (de-cet) ſuperius purgare, cauentes hyemem.*

5.44 *Quæ præter naturam* GRACILES *ſunt grauidæ, abortiunt bimeſtres, priuſquàm craſſeſcant.*

GRAVIDVS, A, VM.

4.1 *(Mulieres)* GRAVIDAE, *ſi(materia) tur-get, medicamentis purgandæ ſunt quarto menſe & uſ-que ad ſeptimum menſem, hæ autem minus, recentio-res uero & prouectiores uereri oportet.* GRA-VIDA. L. MVLIER.

GYMNASTICVS,A,VM. L. ATHLETA.

1.3 In GYMNASTICIS *ſummæ firmæ et ualetudines,periculoſæ ſi in extremo fuerint:non enim poſſunt manere in eodem(gradu)neque quieſcere:cum uero non quieſcunt,nondum poſſunt in melius proficere. reſtat igitur,ut in deterius(cadant).his itaque de cauſis firmam ualetudinem ſine mora prodeſt ſoluere, ut rurſus refectionis originem corpus capiat, neque uero extenuationes ad extremum ducere(oportet) periculoſum enim:ſed qualis fuerit natura eius qui toleraturus eſt,eo uſque ducere (expedit). eodem modo etiam uacuationes,quæ ad extremum ducunt periculoſæ: & rurſus refectiones,quæ in extremo fuerint, periculoſæ.*

HABERE RATIONEM.

1.2 HABERE *rationem oportet & regionis, & temporis,& ætatis,& morborum,in quibus oportet(uacuare),aut non.*

HABITVS.

1.3 *In exercitatoribus boni* HABITVS, *periculoſi.* L. GYMNAST.

HAEMORRHOIDES.

6.11 *Melãcholicis & nephriticis ſi* HAEMORRHOIDES *ſuperuenerint,bonum.*

6.12 *Ei qui* HEMORRHOIDIBVS *longis ſit curatus,niſi una ſeruata fuerit, periculum eſt ne hydrops aut pthiſis ſucceſſerit.*

6.21 *Ex melancholia inſanientibus ſi uarices aut* HAEMORRHOIDES *ſuperuenerint,inſaniæ*

(ipſius fit)ſolutio.

HEPAR.

5.58 HEPATI *inflammato ſingultus ſuccedit.*

6.18 HEPAR *diſciſſum letale.*

6.42 *In ictericis ſi* HEPAR *durum factum fuerit, malum.*

7.17 *Poſt inflammationem* HEPATIS, *ſingultus, malum.*

7.45 *Quicunque* HEPATE *inſuppurato uruntur, aut inciduntur, ſi pus purum fluxerit & album, euadunt; in tunica enim ijs pus continetur: ſi uero ueluti amurca fluxerit, moriuntur.*

7.52 *Quibus* HEPAR *uehementer dolet, febris ſucceſſerit, ſoluit dolorem.*

7.55 *Quibus* HEPAR *aqua repletum in omentum erumperit, ijs uenter aqua impletur, & moriuntur.*

HORA.

4.30 *Quibus* FEBRIS *acceßiones fiunt, quacunque* HORA*(eos) febris dimiſerit, poſtero die eadem* HORA *ſi inuaſerit, difficilis(ſunt) iudicij.*

HORROR.

7.4 *Poſt ſudorem* HORROR, *non bonum.*

HYDROPS. HYDROPICVS,A,VM.

4.11 *Quibus(inſunt)inteſtinorum dolores & circa umbilicum labores & lumborum angor, qui non ſoluatur neque a purgante medicamento neque aliter; (ijs) in* HYDROPEM *ſiccam firmatur. (id eſt tympaniam).*

6.8 HYDROPICIS *ulcera quæ fiunt in cor=pore, non facile ſanantur.*

6.13 HYDROPE *laboranti ſi aqua, quæ in uenis eſt, in aluum fluxerit, (morbi fit) ſolutio.*

6.27 *Quicunque empyi aut* HYDROPICI *uruntur, aut inciduntur, ſi pus aut aqua confertim ef fluxerit, omnino moriuntur.*

6.35 HYDROPICIS *ſi tuſsis ſuperuene=rit, malum.*

7.5 *Poſt maniam dyſenteria aut* HYDROPS *aut mentis alienatio, bonum.*

7.29 *Si ei qui ab albo phlegmate detinetur, diar=rhoea ſuperuenerit uehemens, ſoluit morbum.*

7.47 HYDROPE *laborantem ſi tuſsis corri=piat, (is) diſperatus.*

HYEMS.

1.15 *Ventres* HYEME *& uere natura calidiſ ſimi (ſunt) & ſomni longiſsimi. in iis igitur tempori bus etiam plura alimenta exhibenda: etenim calorem innatum, maiorem habent: pluri itaque alimento indi=gent: indicio ſunt ætates & athletæ.*

3.11 *Inter anni autem tempora, ſi quidem* HY=EMS *ſicca & aquilonia fuerit, uer uero plurimum & auſtrale, neceſſe eſt æſtate febres & ophthalmias & dyſenterias fieri, præcipue mulieribus & uiris na tura humidis.*

3.12 *Si uero auſtralis* HYEMS *& pluuioſa fuerit, uer autem ſiccum & aquilonium, mulieres, qui bus partus ad uer (imminent), ex qualibet cauſa abor*

tiunt: quæcunque autem in utero geſtauerint imbecillos & morboſos infantes pariunt, ita ut uel ſtatim intereant, uel inualidi & morboſi uiuant: aliis uero dyſenteriæ, & ophthalmiæ ſiccæ eueniunt, ſenioribus autem catarrhi, breui interimentes.

3.18 *Per(anni)autem tempora, Vere quidem & prima æſtate pueri & qui eos ætate ſequuntur, optime degunt & ualent maxime: æſtate uero & autumno aliquantiſper ſenes: reliquo autem(tempore, uidelicet)* HYEMIS, *qui medii(ſunt) inter has ætates.*

3.23 HYEME *autem pleuritides(fiunt), peripneumoniæ, lethargi, grauedines, raucitates, tuſſes, dolores pectoris, dolores coſtarum, lumborum, (&) capitis, (&) uertigines, (&) apoplexiæ.*

4.12 *Quibus alui lienteria infeſtantur, (eos)* HYEME *purgare per ſuperiora, malum (eſt).*

HYPOCHONDRIVM.

4.64 *Quibus in febribus(die) ſeptimo uel undecimo uel decimoquarto morbus regius ſucceſſerit, bonum, niſi dextrum* HYPOCHONDRIVM *durum fuerit, ſi uero non, malum; non bonum.*

4.73 *Quibus* HYPOCHONDRIA *eleuata murmurant, lumborum dolore ſuccedente, alui iis humectantur, niſi flatus erumpant, aut urinæ multitudo exeat. in febribus autem hæc(accidunt).*

5.64 *Quibus* HYPOCHONDRIA *eleuata murmurant, lac dare malum(eſt) &c.*

6.40 *Quibus circa* HYPOCHONDRIVM *dolor fit ſine inflammatione, iis febris ſuccedens*

ſoluit dolorem.

ICTERICVS. L. MORBVS REGIVS.

6.42 IN ICTERICIS *ſi hepar durum factum fuerit, malum.*

IECVR. L. HEPAR.

IEIVNIVM.

1.13 *Senes facillime* IEIVNIVM *tolerant, ſecundo loco qui (ætate) uigent, minime adoleſcentes, omnium uero minime pueruli, ex ijs uero ipſis quicunque cæteris promptiores fuerint.*

ILEOS

Quibus poſt ſtranguriam ILEOS *ſuccedit in.7.diebus moriũtur, niſi febre ſubſecuta ſatis urina fluxerit.*

7.10 *Poſt* ILEVM *uomitus aut ſingultus, aut conuulſio, aut delirium, malum.*

IMBECILLVS, A, VM.

4.46 *Si rigor incidit febre non intermittente, iam* IMBECILLO *exiſtente (ægro), letale.*

IMPLERI. L. REPLETIO.

2.11 *Facilius eſt* IMPLERI *potu quàm cibo.*

6.39 INANITIO. L. VACVATIO. L. REPLETIO.

INSANIO.

6.21 *Ex melancholia* INSANIENTIBVS *ſi uarices aut hæmorrhoides ſuperuenerint,* INSANIAE *(fit) ſolutio.*

INFLAMMATIO. L. PHLEGMONE.

INGVEN.

4.55 *In* INGVINVM *tumoribus febres om-*

nes malæ præter ephemeras.

INSIDENTIA. L. SVBSIDENTIA.

INTESTINVM.

4.11 Quibus (ſunt) INTESTINORVM dolores, & iuxta umbilicum labores, & lumborum angor qui non ſoluatur neque a medicamento purgante neque aliter, (ijs malum) in hydropem ſiccam firmatur.

4.20 Nõ febricitantibus ſi euenerint INTESTINORVM dolor & genuum grauitas & lumborum angor, medicamento per inferiora purgante opus eſſe ſignificant.

IVDICO. IVDICATIO. L. CRISIS. IVDICIVM.

6.18 EX INTESTINIS tenuibus aliquod diſciſſum, letale.

6.24 INTESTINORVM tenuium aliquod ſi diſciſſum fuerit, non coaleſcit.

ISCHIAS. L. COXA.

3.28 Plurimi uero morbi puerulis IVDICANTVR, alij in 40 diebus, alij in 7 menſibus, alij in 7 annis, alij cum ad pubertatem accedunt &c.

1.1 IVDICIVM difficile. &c.

3.8 In moderatis temporibus cum tempeſtiua tempeſtiuæ fiunt, morbi ſtabiles & boni IVDICII fiunt; in immoderatis autem inſtabiles & mali IVDICII.

4.29 Quibus in febribus ſextum diem agentibus rigores fiunt, difficilis (ſunt) IVDICII.

1.19 Iis qui per circuitus acceſsiones habent, nihil (oportet) dare, neque cogere, ſed ſubtrahere ijs quæ offeruntur ante IVDICATIONEM.

1.20 Quæ IVDICANTVR & IVDICATA ſunt ſufficienter, non (oportet) mouere neque nouare nec medicamentis purgantibus nec alijs irritamentis, ſed ſinere.

2.23 Acuti morbi IVDICANTVR in quatuordecim diebus.

4.71 Quibus ſeptimo (die) IVDICIVM fit, ijs nubeculam obtinet urina quarto die rubram, & alia ſecundum proportionem.

IVVENIS. IVVENTVS.

2.20 Quibus IVVENIBVS alui humidæ (ſunt) ijs ſeneſcentibus ſiccatur; quibus item IVVENIBVS alui ſiccæ ſunt, ijs ſeneſcentibus humectatur.

2.53 Qui aluos humidas habent IVVENES, melius degunt ſiccas habentibus: in ſenectute autem peius degunt: ſiccantur enim alui magna ex parte ſeneſcentibus.

3.29 IVVENIBVS autem ſanguinis ſpuitiones, phthiſes, febres acutæ, epilepſiæ, & alij morbi, maxime autem prædicti (accidunt). prædicti in pueris uidelicet.

3.30 Qui uero hanc ætatem (id eſt IVVENtutem) exceſſerint, iis aſthmata, pleuritides, peripneumoniæ, lethargi, phrenitides, ardentes (febres), diarrhoeæ longæ, choleræ, dyſenteriæ, lienteriæ, hæmorrhoides (accidunt).

2.1 *In quo morbo ſomnus* LABOREM *facit, letale (eſt): at ſi ſomnus iuuat, non letale.*

2.49 *Aſſueti ſolitos* LABORES *ferre, & ſi ſint imbecilles aut ſenes, non aſſuetis fortibusq; & iuuenibus facilius ferunt.*

LABORO.

2.48 *In omni motu corporis ubi (quis)* LABORARE *cœperit, quieſcere, ſtatim laßitudines remedium eſt.*

4.32 *Quibus conualeſcentibus e morbis pars aliqua* LABORAVERIT, *ibi abſceſſus fiunt.*

4.33 *Sed & ſi quis parte aliqua ante* LABORAVERIT, *quàm ægrotet, ibi firmatur morbus.*

LABRVM.

4.49 *Si in febre non intermittente* LABRVM, *uel ſupercilium, uel oculus, uel naſus peruertaur, ſi non uideat, ſi non audiat, iam imbecillo exiſtēte corpore, quicquid horū acciderit, in propinquo mors (eſt).*

LAC.

5.39 *Si mulier quæ neque grauida ſit, neque pepererit,* LAC *habeat, huic menſtrua defecerunt.*

5.52 *Mulieri grauidæ ſi* LAC *multum è mammis effluxerit, imbecillum fœtum ſignificat, at ſi ſolidæ mammæ fuerint, ſaniorem fœtum ſignificat.*

5.64 LAC *dare quibus caput dolet, malum (eſt); malum item febricitantibus, & quibus hypochondria eleuata murmurant; & ſitibundis, malum etiam quibus (ſunt) building bilioſæ dectiones in acutis febribus, & qui-*

bus ſanguinis multi deiectio facta eſt:congruit autem phthiſicis qui non adeo multum febricitent dare etiam in febribus longis,leuibus,ſi nullum prædictorum ſignorum affuerit.& præter rationem extenuatis.

LACRYMO.

4.52 *Qui in febribus aut in aliis morbis ſponte* LACRYMANT,*nõ abſurdum(eſt);qui uero non ſponte,abſurdius.*

LASSITVDO.

2.5 LASSITVDINES *ſpontaneæ morbos nunciant.*

2.48 LASSVS,A,VM,

In omni motu corporis,ubi(quis) laborare cœperit, quieſcere ſtatim LASSITVDINIS *remedium (eſt).*

4.31 *Laßis in febribus circa articulos & malas maxime abſceſſus fiunt.*

LETALE.

2.1. 4.22.23.24.26.34.35.46.50. 5.1.2. 10.11.12.30.43. 6.18. 7.25.

LEVO.

2.27 *Iis quæ non ex ratione* LEVANT, *non oportet fidere;neque timere multum mala quæ præter rationem eueniunt:plurima enim eiuſmodi ſunt inſtabilia;neque ad modum permanere, neque diu durare conſueuerunt.*

LEIENTERIA.

4.12 *Quibus alui* LEIENTERIA *uexantur, eos hyeme purgare per ſuperiora malum (eſt).*

6.1 Longis LEIENTERIIS ſi accidus ructus ſucceſſerit qui prius non fuerit, ſignum bonum.

6.43 Quicunque lienoſi a dyſenteria corripiuntur; ijs ſuperueniente longa dyſenteria, uel hydrops ſuccedit, uel LIENTERIA, & moriuntur.

7.72 Dyſenteriæ LIENTERIA ſuccedit.

LIENOSVS, A, VM.

6.48 LIENOSIS dyſēteria ſi ſucceſſerit, bonū.

6.43 Quicunque LIENOSI a dyſenteria corripiuntur; ijs ſuperueniente longa dyſenteria, uel hydrops ſuccedit, uel lienteria, & moriuntur.

LINGVA.

7.40 Si LINGVA ſtatim incontinens facta fuerit, aut attonita fuerit aliqua pars corporis, melancholicum tale (eſt)

LIPPIENS.

6.17 LIPPIENTEM diarrhœa correptum eſſe, bonum (eſt).

LVCTVOSVS, A, VM.

6.54 In acutis cum febre morbis LVCTVOSAE reſpirationes, malum.

LVMBI.

4.11 Quibus (ſunt) inteſtinorum dolores, & iuxta umbilicū labores, et LVMBORVM angor, qui non ſoluuntur neque a medicamento purgante neque aliter, (iis malum) in hydropem ſiccam firmatur.

4.20 Non febricitantibus ſi euenerint inteſtinorū dolor, et genuū grauitas, & LVMBORVM angor, medicamēto per inferiora purgāte opus eſſe ſignificāt.

4.7 *Quibus hypochondria eleuata murmurant* L V M B O R V M *dolore ſuccedente, alui iis humectantur, niſi flatus erumpant, aut urinæ multitudo exeat. in febribus uero hæc (accidunt).*

M A G N I T V D O.

2.54 M A G N I T V D I N E M *corporis ineſſe iuuenibus pulchrum eſt, neque indecens, ſenibus uero inutile, & peius, quàm ſi parui ſint.*

M A L A, AE.

6.19 *Cum diſciſſum fuerit os, aut chartilago, aut neruus aut.* M A L AE *tenuis particula aut præputium, neque augetur, neque coaleſcit.*

M A L V M.

2.27 *Iis quæ non ex ratione leuant, non oportet fidere, neque timere multum* M A L A, *quæ præter rationē eueniunt: plurima. n. iuſmodi ſunt inſtabilia: neque ad mūod permanere, neque diu durare cōſueueunt.*

M A L E S E H A B E R E.

2.32 *Magna ex parte omnes qui* M A L E S E H A B E N T, *in principiis cibum bene capientes, & nihil proficientes, in fine rurſus cibum non appetunt: qui uero in principiis cibum uehementer abhorrēt, poſtea autem bene cibum capiunt, melius degunt.*

M A M M A. L. M V L I E R.

M A N I A, I D E S T, F V R O R.

6.56 *In melancholicis morbis ad has partes decubitus (ſunt) periculoſi: aut corporis apoplexiam, aut conuulſionem, aut* M A N I A M, *aut cæcitatē ſignificant.*

7.5 *Poſt* M A N I A M *dyſenteria, aut hydrops,*

aut mentis alienatio,bonum.

MEDICAMENTVM PVRGANS. L. PVRGANS.

MEDICVS.

1.1 *Vita breuis,ars longa,occaſio præceps, experimentum periculoſum,iudicium difficile.oportet autem non ſolum*(MEDICVM) *ſe ipſum præſtare, ut ea quæ opus ſunt,faciat,ſed & ægrum, & aſsidentes,& exteriora.*

MELANCHOLIA. MELANCHOLICVS,A,VM.

4.9 MELANCHOLICOS *autem uehementius per inferiora(purgabis),eadē ratione contraria adhibens.*

6.11 MELANCHOLICIS *& nephriticis ſi hæmorrhoides ſuperuenerint,bonum.*

6.21 Ex MELANCHOLIA *inſanientibus ſi uarices aut hæmorrhoides ſuperuenerint, inſaniæ (fit)ſolutio.*

6.23 *Si timor & mœſtitia longo tempore perſeuerent,*MELANCHOLICVM *tale (eſt).*

6.56 In MELANCHOLICIS *morbis ad has partes decubitus(ſunt)periculoſi:aut apoplexiam corporis,aut conuulſionem,aut maniam, aut cæcitatem ſignificant.*

7.40 *Si lingua repente infirma facta fuerit, aut ſtupida fuerit aliqua pars corporis,* MELANCHOLICVM *tale (eſt).*

MENS.

2.6 Quicunque dolentes parte aliquã corporis om nino,dolores non ſentiunt,ijs MENS ægrotat.

7.5 Poſt maniam dyſenteria,aut hidrops,aut ecyſta ſis(.I. MENTIS alienatio),bonum.

MENSES. MENSTRVA. MVLIEBRES purgationes. L. MVLIER.

MICTIO.

4.83 MICTIO noctu ſi fiat multa,exiguam deiectionem ſignificat.

MOESTITIA.

6.23 Si timor & MOESTITIA longo tempore durent,melancholicum id(exiſtit):

MORBVS.

1.6 Ad extremos MORBOS extrema exquiſite remedia optima(ſunt).

1.7 Vbi igitur peracutus(eſt)MORBVS, extremos ſtatim labores obtinet,& uictũ ad extremum tenuiſsimo uti neceſſe eſt.ubi uero non,ſed licet copioſiorem uictum exhibere,tantum declinandum(eſt a uictu tenui),quanto MORBVS mitior extremis fuerit.

1.12 Item urinæ & alui excrementa & ſudores ſi ſuperueniant,iudicant morbos et difficiles iudicatu & faciles,& breues & longos.

2.1 In quo MORBO ſomnus laborem facit, letale;ſi uero ſomnus iuuat,non letale.

2.8 Si quis poſt MORBVM cibum capiens,non corroboratur,ſignificat pluri cibo corpus uti; ſi uero cibum non capienti id accidat,ſciendum eſt ,quod uacuatione indigeat.

2.31 *Si cui poſt* MORBVM *cibum bene ca=pienti, nihil augeatur corpus, malum.*

2.12 *Quæ relinquantur in* MORBIS *poſt cri ſim, recidiuas facere coſueuerunt.*

2.17 *Vbi cibi plus præter naturam ingeſtum eſt, id* MORBVM *facit: declarat autem (id) ſanatio.*

2.19 *Acutorum* MORBORVM *non omnino tutæ (ſunt) prædictiones neque ſalutis neque mortis.*

2.22 *Quicunque a repletione* MORBI *facti fuerint, (eos) euacuatio curat, & quicunque ab eua=cuatione, repletio: item aliorum oppoſitio.*

2.23 *Acuti* MORBI *iudicantur in quatuorde=cim diebus.*

2.29 MORBI *cũ incipiũt, ſi quid mouẽdũ uidetur, moue; cũ uero cõſiſtũt ac uigent, quieſcere melius eſt.*

2.30 *In* (MORBI) *initijs & finibus omnia imbe cilliora, in uigore autem ualidiora.*

2.33 *In omni* MORBO *conſtare mente, & bene ſe habere ad cibos oblatos, bonum; contra uero, malum.*

2.34 *In* MORBIS *minus periclitantur quibus natura et habitu et ætate et tẽpe* MORBVS *propinqu us magis ſit, q̃ qbus nõ propinquus (ſit) in horũ aliquo.*

2.35 *In omnibus* MORBIS *partes ad ubilicum & imum uentrem attinentes, craßitudinem habere melius eſt; multum autem extenuari & contabeſcere, malum (eſt): periculoſum uero hoc idem & ad purga=tiones quæ per inferiora fiunt.*

2.39 *Senes magna ex parte minus quam iuuenes ægrotant quicũque aũt ipſis* MORBI *longi accidũt,*

ut plurimum(eos)ad mortem comitantur.

3.1 Mutationes temporũ maxime pariunt MORBOS,*& in temporibus magnæ mutationes aut frigoris aut caloris, & alia ſecundum rationem eodem modo.*

3.3 MORBORVM *alii ad alios bene maleue ſe habent. item ætates quædam ad tempora & regiones, & uictum.*

3.4 In temporibus, cum eodem die modo calor, modo frigus fuerit, autumnales MORBOS *expectare oportet.*

3.7 In ſiccitatibus febres acutæ fiunt. & ſi quidem magna ex parte talis annus fuerit, qualem fecit conſtitutionem, magna ex parte etiam MORBOS *tales oportet expectare.*

3.8 In moderatis temporibus cum tempeſtiue tempeſtiua fiunt, bene ſtabiles & boni iudicii MORBI *fiunt; in immoderatis autem inſtabiles & mali iudicii.*

3.9 In autumno MORBI *acutiſſimi & exitioſiſsimi omnino(accidunt):uer autem ſaluberrimum et minime exitioſum.*

3.16 MORBI *uero in pluuiis magna ex parte fiunt, febresq; longæ, & alui fluxus, & putredines et epileptici, & apoplectici, & anginæ: in ſiccitatibus autem tabes, ophthalmiæ, arthritides, ſtranguriæ, & dyſenteriæ.*

3.19 Sed MORBI, *omnes quidem in omnibus temporibus fiunt, magis tamen quidam in aliquibus ipſo=*

ipſorum & fiunt & irritantur.

3.28 Plurimi autem MORBI *puerulis iudicantur, alij in 40 diebus, alii in ſeptem menſibus, alii in ſeptem annis, alii cum ad pubertatem accidunt: quicunque autem puerulis perdurauerint, nec circa pubertatem deſierint, aut fœminis circa menſtruorum eruptiones, (ii) conſeneſcere conſueuerunt.*

L. AETAS. PVERI, PVERVLI, IVVENES, SENES. VER, AESTAS, AVTVMNVS, HYEMS. CONSTITVTIO.

*4.10 Purgante medicamento uti (oportet) in ualde acutis (*MORBIS*), ſi materia turget, eodem die: cunctari enim in talibus malum (eſt).*

4.22 MORBIS *quibuslibet incipientibus, ſi bilis atra uel ſupra uel infra exierit, letale.*

4.23 Quibus ex MORBIS *acutis, aut ex longis, aut ex ictibus, aut alio quouis modo extenuatis, bilis atra aut ueluti ſanguis niger exierit, poſtridie moriuntur.*

4.32 Quibus conualeſcentibus e MORBIS *pars aliqua laborauerit, ibi abſceſſus fiunt.*

4.33 Sed ſi (cui) etiam pars quædam doluerit prius quàm ægrotet, ibi firmatur MORBVS.

4.36 MORBI *longitudinem ſignificant.*

4.38 Ex qua parte corporis ſudor eſt, ibi MORBVM *nunciant.*

4.39 Et qua parte corporis frigus aut calor (eſt), ibi MORBVS *(eſt).*

4.42 *Sudor multus ſemper fluens, frigidus quidem longiorem: calidus uero, breuiorem* MORBVM *ſignificat.*

4.51 *In febribus abſceſſus qui non ſoluunt in primis iudicationibus. longitudinem* MORBI *ſignificant.*

4.57 *Qui a conuulſione, aut diſtētione infeſtatur, ſi (ei) febris ſucceſſerit, ſoluit* MORBVM.

4.60 *Quibus in febribus aures obſurduerint, ſi ſanguis e naribus fluxerit, aut aluus turbata fuerit, ſoluit* MORBVM.

5.57 *Menſtruis aduenientibus immodicis* MORBI *contingunt: & non aduenientibus, ex utero fiunt* MORBI.

6.54 *In acutis* MORBIS *qui cum febre (ſunt), luctuoſæ reſpirationes, malum.*

6.56 *In melancholicis* MORBIS. L. MELANCHOLICVS.

7.1 *In acutis* MORBIS *frigiditas extremarum partium, malum.*

7.6 *Poſt longum* MORBVM *cibi faſtidium et ſinceræ deiectiones malum.*

7.31 *Quibus febricitantibus in urinis ſubſidentiæ fiunt ueluti craſſæ farinæ, longum* MORBVM *ſignificant.*

7.32 *Quibus uero billioſæ (nunc ſunt) ſubſidentiæ (quæ fuerunt) prius tenues, acutum* MORBVM *ſignificant.*

7.34 *Quibus in urinis ſuperſtant bullæ, nephriti-*

ea ſignificant, & longum MORBVM *futurum.*

7.35 *Quibus uero pinguis (eſt) ſuperficies & conferta, ijs nephriticos* (MORBOS) *& acutos ſignificat.*

7.49 *Ab angina correpto tumor & rubor in pectore ſuperueniens, bonum. extra enim uertitur* MORBVS.

7.56 *Anxietudinem, oſcitationem, horrorem, uinum æquale æquali (aquæ mixtum) potum ſoluit* MORBVM.

MOTVS. MOVEO.

2.48 *In omni* MOTV *corporis ubi (quis) laborare cœperit, quieſcere, ſtatim laßitudinis remedium (eſt).*

2.51 *Aut aliter quomodocunque corpus* MOVERE, *periculoſum. &c.*

3.17 *In oculis autem & corporibus difficilē* MOTVM *(efficiunt auſtrales conſtitutiones) & aluos humectant.*

4.14 *Cum biberit quis elleborum, ad corporis quidem* MOTVS *magis ducere (oportet), ad ſomnos uero & ad non motus minus, indicat autem nauigatio quòd* MOTVS *corpora turbat.*

4.15 *Cum uelis magis ducere elleborum,* MOVE *corpus: cùm uero ceſſare, ſomnum fac, & ne moue.*

MVLIER. MVLIEBRIS. MENSTRA.

3.12 *Si uero auſtralis hyems & pluuioſa fuerit, uer autem ſiccum & aquilonium,* MVLIERES

quibus partus ad uer (imminet), ex qualibet cauſa ab ortiunt: quæcunque autem pepererint, imbecillos & morboſos infantes parient, ita ut uel ſtatim intereant uel graciles & morboſi uiuant, alijs uero dyſenteriæ, & ophthalmiæ ſiccæ eueniunt, ſenioribus autem catarrhi breui intermittentes.

3.14 *Si uero (autumnus) aquilonius fuerit & ſiccus, iis qui natura humidi ſunt et* MVLIERIBVS *confert: reliquis uero opthalmiæ ſiccæ aderunt & febres acutæ, & longæ; quibuſdam uero etiam melancholiæ.*

5.28 MVLIEBRES *purgationes educit ſuffitus aromatum: ſæpe uero ad alia etiam utilis eſſet, niſi capitis grauitatem induceret.*

4.1 (MVLIERES) *grauidæ, ſi materia turget medicamentis purgandæ ſunt quarto menſe & uſque ad ſeptimum menſem, hæ autem minus: recentiores uero & prouectiores uereri oportet.*

5.30 MVLIERI *grauidæ, ſi ab aliquo ex acutis morbis corripiantur, letale.*

5.31 MVLIER *grauida, ſi ei ſecta fuerit uena, abortit; idque magis, ſi fœtus maior fuerit.*

5.32 MVLIERI *ſanguinem euomenti ſi menſtrua eruperint, (morbi fit) ſolutio.*

5.33 MVLIERI *menſtruis deficientibus, ſi ſanguis e naribus fluxerit, bonum.*

5.34 MVLIERI *grauidæ ſi aluus nimis fluxerit, periculum ei eſt abortiendi.*

5.35 MVLIERI *ab uteri ſtrangulationibus*

uexatæ aut ægre parienti, ſternutatio ſuperueniens bonum.

5.36 MVLIERI *menſtrua decolorata, neque eodem tempore ſemper exeuntia, purgatione opus eſſe, ſignificant.*

5.37 MVLIERI *grauidæ ſi ſtatim mammæ graciles factæ fuerint, abortit.*

5.38 MVLIERI *grauidæ ſi altera mamma gracilis facta fuerit geminos habenti alterum abortit: & ſi dextra gracilis facta fuerit, marem; ſi uero ſiniſtra fœminam,*

5.39 *Si* MVLIER *quæ neque grauida ſit neque pepererit, lac habet, huic menſtrua defecerunt.*

5.40 MVLIERIBVS, *quibus ad mammas ſanguis conuoluitur, maniam ſignificat.*

5.41 MVLIEREM *ſi noſſe uelis, an ſit prægnans; cum ſit dormitura non ſine cœna, ei melicratum da bibere: & ſi tormina uentris ipſam corripiant, grauida eſt, ſin minus, grauida non eſt.*

5.42 MVLIER *prægnans ſi marem gerit, bene colorata eſt; ſi uero fœminam, male colorata.*

5.43 *Si* MVLIERI *grauidæ eryſipelas in utero factum fuerit, letale.*

5.44 *Quæ præter naturam tenues ſunt grauidæ* (MVLIERES), *abortiunt bimeſtres priuſquàm craſſeſcant.*

5.45 *Quæcunque* (MVLIERES) *mediocrem habitum corporis habentes abortiũt bimeſtres aut trimeſtres ſine cauſa manifeſta; iis uteri acetabula mu-*

core plena ſunt, & non poſſunt ſuſtinere præ grauitate fœtum, ſed abrumpitur.

5.46 Q*uæ* (MVLIERES) *præter naturam craſſæ non concipiunt utero, iis omentum os uteri deprimit, & ante quàm extenuentur, non concipiunt.*

5.47 *Si* (MVLIERI) *uterus, qua parte coxæ incumbit, ſuppurauerit, neceſſe eſt emmoton factum eſſe.* (Emmoton *eſt medicamentum liquidum, quod linamentis quæ* Græce μοτὰ *uocantur, excipitur, & in ulcera mittitur.*

5.48 *Fœtus* (*in* MVLIERIBVS) *mares quidem in dextris, fœminæ uero in ſiniſtris magis* (*continentur.*)

5.49 *Vt ſecundæ excidant* (MVLIERI), *ſternutatorio appoſito apprehende nares & os.*

5.50 MVLIERI *menſtrua ſi uelis ſiſtere, cucurbitam quàm maximam ſub mammis applica.*

5.51 Q*uæ grauidæ ſunt* (MVLIERES), *ijs uteri os coarctatum eſt.*

5.52 MVLIERI *grauidæ ſi lac multum e mammis fluxerit, imbecillum fœtum ſignificat: ſi uero ſolidæ mammæ fuerint, ſaniorem fœtum ſignificant.*

5.53 Q*uæ* (MVLIERES) *diſperſuræ ſunt fœtus, ijs mammæ tenues fiunt: at ſi duræ factæ fuerint, dolor erit aut in mammis, aut in coxis, aut in genibus, aut in oculis, & non abortiunt.*

5.54 Q*uibus* (MVLIERIBVS) *os uteri durum eſt, iis neceſſe eſt os ueteri coarctari.*

5.54 *Quæ grauidæ a febribus corripiuntur(*MVLIERES*)& uehementer extenuantur ſine cauſa manifeſta,(eæ)ægre & periculoſe pariunt,aut abortientes periclitantur.*

5.56 *Fluori* MVLIEBRI *ſi cõuulſio & animi defectus ſucceſſerint,malum.*

5.57 (MVLIERIBVS)*menſtruis aduenientibus immodicis,morbi contingunt ; & ſi non aduenerint,ab utero morbi fiunt.*

5.58 *Recto inteſtino & utero(in* MVLIERE) *inflammatis,ſtillicidium urinæ ſuccedit, item renibus ſuppuratis ſtillicidium urinæ ſuccedit, & hepati inflammato ſingultus ſuccedit.*

5.59 MVLIER *ſi non concipiat in aluo, uelis autem ſcire an conceptura ſit,obuoluens eam ueſtimẽtis ſuffi ab imo;& ſi tranſire tibi uideatur odor per corpus ad nares & ad os,ſcito ipſam non ex ſe ipſa eſſe ſterilem.*

5.60 *Si* MVLIERI *grauidæ, purgationes (menſtruæ)exeant,impoßibile eſt fœtum eſſe ſanum.*

5.61 *Si* MVLIERI *purgationes (menſtruæ) non exeant,neque ſi horror neque febris ſucceſſerit,cibi autem faſtidia incidant, eam grauidam eſſe exiſtima.*

5.62 *Quæ frigidos & denſos uteros habent(*MVLIERES*),non concipiunt;extinguitur enim in eis genitura,& quæ ualde ſiccos & efferueſcẽtes,defectu enim alimenti corrumpitur ſemen:quæ uero ex utriſque mediocrem habent tẽperaturã,tales fœcũdæ fiunt.*

5.63 *Similiter uero & in maribus (euenit, ut in* MVLIERIBVS.*) aut enim propter corpors raritatem ſpiritus extra fertur, ita ut ſemen non emittatur, aut ob denſitatem humor non abit foras; aut ob frigiditatem non excaleſcit ut in eum locum congregetur; aut ob caliditatē illud idem euenit.*

5.69 *Refrigerationes incipiunt* MVLIERIBVS *quidem ex lumbis magis, & per dorſum ad caput, uiris autem magis in poſteriore quàm in anteriore parte corporis ut in cubitis & coxis. ſed & cutis (horum eſt) rara: oſtendit autem id pilus.*

6.29 MVLIER *podagra non laborat, niſi ei menſtrua deficiant.*

7.27 MVLIERI *grauidæ teneſmus ſi ſucceſſerit, (eam) abortire facit.*

7.43 MVLIER *ambidextra non fit.*

MVTATIO.

3.1 MVTATIONES *temporum maxime pariunt morbos, & in temporibus magnæ* MVTATIONES *aut frigoris aut caloris, & alia ſecundum rationem eodem modo.*

4.40 *Et ubi in toto corpore* MVTATIONES *fiunt, & modo corpus frigeſcat, modo caleſcat, aut color alius ab alio fiat, longitudinem morbi ſignificant.*

MVTVS.

6.51 *Quibus ſanis dolores fiunt repente in capite & ſtatim* MVTI *fiunt, & ſtertunt, moriuntur in ſeptem diebus, niſi (eos) febris apprehenderit.*

7.34 *Quibus in urinis ſuperſtant bullæ, (iſs)* NE

PHRITICA *ſignificant, & longum morbum fore.*

7.75 *Quibus uero pinguis inſidentia & conferta, iis* NEPHRITICA *& acuta ſignificat.*

7.36 *Quibus autem* NEPHRITICIS *prædicta accidunt ſigna, doloresque circa ſpinæ muſculos fiunt, ſi quidem circa loca exteriora fiant, abſceſſus etiam exteriores fore expecta; ſi uero magis dolores circa loca interiora fiant, abſceſſum quoque interiorem magis fore expecta.*

NARES.

6.2 *Quibus* NARES *natura(ſunt) humidiores & genitura humidior, (iis) peius ualent; quibus uero contra, melius.*

NATVRA.

3.2 NATVRARVM *aliæ æſtate, aliæ hyeme bene aut male afficiuntur.*

NEPHRITICVS.

6.11 *Melancholicis &* NEPHRITICIS *ſi hæmorrhoides ſuperuenerint, bonum.*

NERVORVM DISTENTIO. L. DISTENTIO.

NERVORVM CONVVLSIO. L. CONVVLSIO.

NERVVS.

6.19 *Vbi* NERVVS *diſciſſus fuerit, neque augetur, neque coaleſcit.*

7.28 NIMIVM.

2.51 *Omne* NIMIVM *naturæ(eſt) inimicum.*

NIX.

5.24 Frigida ut N I X & glacies, (ſunt) pectori inimica, tuſſes mouent, ſanguinem fundunt, & catarrhos excitant.

NOCTV

4.83 Mictio N O C T V ſi fiat multa, exiguam deiectionem ſignificat.

5.27 Quibus bibendi appetitus N O C T V (adſunt) iis ualde ſitientibus, ſi obdormierint, bonum.

NVTRIO

2.9 Impura corpora quo magis N V T R I E S, (eo) magis lædes.

2.18 Eorum quæ confertim & cito N V T R I V N T, citæ etiam excretiones fiunt.

2.15 Si uero (excretiones) ſimiles ſanis fiant, tutum eſt corpus N V T R I R E.

OCCASIO

1.1 Vita breuis, ars longa, O C C A S I O præceps, experimentum periculoſum, iudicium difficile. &c.

OCVLI.

6.22 Conſiderare autem oportet & ea quæ leuiter appareant in O C V L I S dormiētium: ſi enim commiſſis palpebris albi aliquid apparet, quod ex diarrhœa aut medicaminis purgantis potione non proueniat, prauum ſignum (eſt) & ualde letale.

6.31 Dolores O C V L O R V M meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut uenæ ſectio aut medicamentum purgatorium ſoluit.

7.46 Dolores O C V L O R V M, ubi merum bibe

ris, & multa (aqua) calida laueris, uenæ ſectione curato.

7.3 *Poſt uomitum,ſingultus,&* OCVLI *rubri, malum.*

OMENTVM.

6.58 *Si* OMENTVM *exciderit,neceſſe eſt ut putreſcat.*

OMNIA.

2.52 OMNIA *ratione facienti,& (ipſis)ratio ne non ſuccedentibus,ad aliud non eſt tranſeundum, manente eo quod principio uiſum fuerit.*

OPORTET.

1.1 OPORTET *uero(*MEDICVM*) non ſolum ſe ipſum præſtare,ut ea quæ neceſſaria ſunt, faciat,ſed ægrotum etiam,& eos qui adſunt, & ea quæ extrinſecus(contingunt).*

OSCITATIO. L. ANXIETVDO.

OS, OSSIS.

9.19 *Vbi diſciſſum fuerit os,aut chartilago , aut neruus,aut malæ particula tenuis, aut præputium, neque augetur neque coaleſcit.*

7.28 *Quodcunque os,aut chartilago, aut neruus diſciſſus fuerit in corpore,neque augetur neque coaleſcit.*

6.45 *Vlcera quæcunque annua fiunt,aut longiore tempore durant,neceſſe eſt(in ijs)os abſcedere,& cicatrices cauas fieri.*

7.21 *Super* OSSE *ægrotante caro liuida,malum.*

7.19 *Poſt* OSSIS *denudationem eryſipelas.*

(malum).

7 24 *Poſt* O S S I S *(in capite) diſciſsionem, deſipientia (fit), ſi uacuum apprehenderit.*

7.73 *Poſt corruptionem,* O S S I S *abſceſſus (ſuccedit).*

PAROXYSMI. L. ACCESSIONES.

PAVLATIM.

2.51 *Quod uero* PAVLATIM *fit, tutum (id eſt), præſertim ubi quis ex una re in aliam tranſeat.*

PERIPNEVMONIA.

6.16 *Pleuritide aut* PERIPNEVMONIA *laboranti ſi diarrhœa ſuccedat, malum.*

7.11 *Poſt pleuritin* PERIPNEVMONIA *malum,*

7.12 *Poſt* PERIPNEVMONIAM *phrenitis, malum.*

PHLEGMA.

7.30 *Quibus (ſunt) ſpumoſa excrementa in diarrhœis, iis a capite* PHLEGMA *defluit.*

7.54 *Quibus inter ſeptum tranſuerſum & uentrem* PHLEGMA *reſidet, & dolorem præbet, ut pote quòd exitum non habeat, ne ad alterum quidem uentrem; iis per uenas ad ueſicam uerſo* PHLEGMATE, *ſolutio fit morbi.*

7.29 *Si ei qui* PHLEGMATE *albo detinetur, diarrhœa ſucceſſerit uehemens; ſoluit morbum.*

7.70 *Albo* PHLEGMATI *hydrops ſuccedit.*

PHRENITICI. PHRENITIS.

4.72 *Quibus urinæ perſpicuæ, (&) albæ, malæ,*

maxime uero in PHRENITICIS *ſi apparcant.*

7.12 *Poſt perineumoniam* PHRENITIS, *malum.*

PHTHISICI. PHTHISIS.

4.8 PHTHISICOS *uitans, ne unquam ad ſupernas purgationes duxeris.*

5.9 PHTHISIS *accidit ijs maxime qui ſunt in ætatibus ab anno decimo octauo uſque ad* XXXV.

5.11 *His qui* PHTHISIBVS *uexantur, ſi ſputum quod extußierint, graue oleat carbonibus infuſum, & capilli a capite fluant, letale.*

5.12 *Quibus* PHTHISICIS *capilli a capite fluant, ij diarrhœa ſuperueniente moriuntur.*

5.13 *Qui ſanguinem ſpumantem expuunt, ijs a pulmone talis reiectatio fit.*

5.14 PHTHISICO *ſi diarrhœa ſuperuenenerit, letale.*

5.15 *Qui ex pleuritide empyi fiunt, ſi per ſputa expurgantur in quadraginta diebus, ex quo ruptio facta fuerit, liberantur: ſi uero non, in* PHTHISIS *transferuntur.*

5.63 *(Lac) congruit* PHTHISICIS *qui non admodum febricitant.*

7.16 *Poſt puris ſputum* PHTHISIS *& effluxus: cum uero ſputum retinetur, moriuntur.*

PINGVIS.

7.35 *Quibus (in urina ineſt)* PINGVIS *inſtadētia & cōgeſta, ijs renū morbos & acutos ſignificat.*

PLEVRITICI. PLEVRITIS.

2.12 In PLEVRITICIS *ſputum ſi ſtatim apareat morbi initio,(morbus) fit breuis: ſi uero poſt, prorogatur.&c.*

5.8 *Quicunque* PLEVRITICI *facti per ſuperiora non purgantur in quatuordecim diebus,ijs in empyema(morbus)tranſmutatur.*

5.15 *Qui ex* PLEVRITIDE *empyi fiunt, ſi per ſputa expurgantur in 40 diebus,ex quo ruptio facta fuerit, liberantur; ſi uero non,in phthiſin tranſeunt.*

6.16 PLEVRITIDE *aut peripneumonia laboranti ſi diarrhœa ſucceſſerit,malum.*

6.33 *Qui acidum ructum habent, non admodum* PLEVRITICI *fiunt.*

7.11 *Poſt* PLEVRITIN *peripneumonia, malum.*

PLVRIMVM.

2.51 PLVRIMVM *& repente uacuare aut replere,aut calfacere,aut refrigerare, aut aliter quomodocunque corpus mouere,periculoſum.nam & omne nimium naturæ(eſt) inimicum.quod uero paulatim fit,tutum(id eſt),præſertim ubi qui ex una re in aliam tranſeat.*

PLVVIA. L. CONSTITVTIO. L. HYEMS.

3.15 *Inter anni conſtitutiones in ſumma ſiccitates* PLVVIIS *ſunt ſalubriores, minus letales.*

3.16 *Morbi in* PLVVIIS *quidem magna ex parte fiunt, & febres longæ, & alui fluxiones, & pu*

tredines & epileptici, & apoplectici, & anginæ: in ſiccitatibus autem, phthiſies, ophthalmiæ, arthritides, ſtranguriæ, & dyſenteriæ.

PODAGRA.

6.28 *Eunuchi* PODAGRA *non laborant, neque calui fiunt.*

6.29 *Mulier* PODAGRA *non laborat, niſi ei menſtrua deficiant.*

6.30 *Puer* PODAGRA *non laborat, prius quàm uenere utatur.*

6.49 *Quæcunque* PODAGRICI *morbi fiunt, ij ſedata inflammatione, in quadraginta diebus finiunt.*

6.55 PODAGRICI *morbi uere & autumno magna ex parte mouentur.*

POTATIO.

7.7 *Ex multa* POTATIONE *(uini), rigor et deſipientia, malum.*

POTVS.

2.11 *Facilius (eſt) impleri* POTV, *quàm cibis.*

2.38 *Paulo deterior* POTVS & *cibus, ſuauior autem, melioribus & inſuauioribus magis (eſt) expetendus.*

PRAEGNANS. L. MVLIER,

5.30. 5.31. 5.34. 5.37 5.38. 5.41. 5.42. 5.43. 5.48. 5.59 5.61.

PRINCIPIVM.

2.30 *Circa uero (morborũ)* PRINCIPIA *et fines, omnia imbecilliora, circa uigorem autem ue*

hementiora.

PVER. PVERVLVS.

2.45 Epilepticos PVEROS *liberant mutatio nes maxime ætatis, & locorum, et uictuum.*

3.24 *In ætatibus talia accidunt, paruis quidem et nuper natis* PVERVLIS *aphthæ (quæ ſunt ſerpentia oris ulcera) uomitus, tuſſes, uigiliæ, pauores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.*

3.25 *Ijs uero* (PVERIS), *qui ad dentiendum accedunt, (accidunt) gingiuarum pruritus, febres, conuulſiones, diarrhœæ, & maxime cum caninos dentes edunt, & ijs* PVERIS *qui craßißimi ſunt, & ijs qui aluos duras habent.*

3.26 Adultioribus *autem factis* (PVERIS *fiunt) tonſillæ, uertebræ quæ in occipitio (eſt), ad interiora luxationes, aſthmata, calculi, lumbrici rotundi, aſcarides, acrochordones (id eſt uerrucæ penſiles) ſatyriaſmi, ſtrumæ, & alia tubercula, præcipue uero ante dicta.*

3.27 *Adhuc uero adultioribus* (PVERIS), & *ad pubertatem accedentibus, & horum (prædictorum morbi accidunt) multi, & febres longæ magis, & e naribus ſanguinis fluxus.*

3.28 *Plurimi autem* PVERVLIS *morbi iudicantur, alij quidem in quadraginta diebus, alij uero in ſeptem menſibus, alij in ſeptem annis, alii cum ad pubertatem accedunt: quicunque autem (morbi)* PVERVLIS *perdurauerint, neque circa pubertatem deſierint aut fœminis circa (primas) menſtum eruptiones*

nes

nes,(ii)longo tempore durare conſueuerunt.

6.30 PVER *podagra non laborat ante uſum Veneris.*

PVLMO.

5.10 *Qui anginam effugiunt,ad* PVLMONEM *iis(malum)uertitur,& in ſeptem diebus pereunt:ſi uero hos effugerint,empyi fiunt.*

PVLSVS.

7.21 *Poſt uehementem in ulceribus* PVLSVM, *multa(fit)ſanguinis eruptio.*

PVRGARE PVRGATIO, PVRGANS MEDICAM. L. DEIECTIO. & L. EXCRETIO. & L. EVACVATIO.

1.2 *In perturbationibus uentris & uomitibus qui ſua ſponte eueniunt,ſi qualia* PVRGARI *oportet,* PVRGANTVR,*confertq́; & facile ferunt; ſin minus,contra:ſic & uaſorum euacuatio,ſi qualis fieri oportet,fiat,confertq́;,& breue ſe habent; ſin minus, contra:habere ergo oportet rationem & regionis & temporis & ætatis,& morborum,in quibus oportet, aut non.*

1.3 *Similiter uero & euacuationes quæ ad extremum agunt,periculoſæ.&c.*

1.20 *Quæ iudicantur & iudicata ſunt integrè, non(oportet)mouere,neque nouare neque medicamentis,neque aliis irritamentis ſed ſinere.*

1.21 *Quæ educenda ſunt;quo maxime tendit natura eo educenda, per (ea uidelicet) loca quæ conferunt.*

1.22 *Concocta* PVRGANTE *medicamento uacuare & mouere(oportet),non (ea quæ ſunt)cruda neque in morborum principiis niſi (humores) turgeant:ut plurimum uero non turgent.*

1.23 *Quæ euacuantur,non multitudine ſunt æſtimanda,ſed quòd qualia oportet,euacuantur,et(æger) fert facile.atque ubi oportet, uſque ad animi deliquium educendum eſt; & hoc faciendum,ſi perdurauerit æger.*

1.24 *In acutis morbis raro,& in principiis utendum eſt medicamentis* PVRGANTIBVS:*idque præmiſſo diligenti iudicio faciendum.*

1.25 *Si qualia oportet* PVRGARI, PVRGANTVR,*& confert,& facile ferunt(ægrotantes)contra uero,grauiter.*

2.8 *Si quis poſt morbum cibum capiens,non corroboratur, ſignificat pluri cibo corpus uti;ſi uero cibũ non capiente id accidat,ſciendum eſt,quod uacuatione indigeat.*

2.9 *Non pura corpora quo magis nutries.(eo) magis lædes.*

2.10 *Corpora ubi aliquis* PVRGARE *uult, oportet fluida facere.*

2.17 *Vbi cibus magis præter naturam ingeſtus eſt,is morbum facit:declarat autem(ipſum)ſanatio(id eſt,euacuatio.)*

2.22 *Ex repletione morbos,quicunque fiant, uacuatio ſanat;quicunque uero ex uacuatione, repletio:item aliorum oppoſitio.*

2.29 *Morbi cum incipiunt,ſi quid mouendum uidetur,moue;cum uero conſiſtunt,ac uigent,quieſcere melius eſt.*

2.30 *In morbi initiis & finibus omnia(ſunt) imbecilliora;in uigore autem,ualidiora.*

2.35 *In omnibus morbis partes ad umbilicum & ad imum uentrem attinentes craßitudinem habere melius eſt:multum autem extenuari & contabeſcere malum(eſt):periculoſum uero hoc idem & ad* PVRGATIONES *quæ per inferiora fiunt.*

2.36 *Sana habẽtes corpora,ſi medicamẽtis purgentur,exoluuntur celeriter,& qui prauo cibo utuntur.*

2.37 *Qui corpora habent commoderata,(ii ſunt)* PVRGATV *difficiles.*

2.51 *Plurimum & repente uacuare, aut replere, aut calefacere,aut refrigerare aut aliter quomodocunque corpus commouere periculoſum:& (enim) omne nimium naturæ (eſt) inimicum:quod uero paulatim fit,tutum(id eſt), præſertim ubi quis ex una re in aliam tranſeat.*

4.1 *Grauidas(mulieres),ſi(materia)turget medicamentis* PVRGARE *conuenit quarto menſe & uſque ad ſeptimum menſem;hæ autem minus: recentiores uero & prouectiores uereri oportet.*

4.2 *In medicamentis* PVRGANTIBVS *talia ex corpore(oportet)educere,qualia etiam ſponte exeuntia utilia eſſent;quæ uero contra,cohibere.*

4.3 *Si qualia oportet* PVRGARI.*&c.*

4.4 *Medicamentis* PVRGARE*(oportet)æſta*

te quidem uentres ſuperiores, hyeme uero inferiores.

4.5 *Sub cane & ante canem moleſta ſunt* PVRGANTIA *medicamenta.*

4.6 *Graciles & ad uomitum faciles per ſuperiora* PVRGARE*(conuenit), cauentes hyemem.*

4.7 *Ad uomitum autem difficiles & mediocriter carnoſos per inferiora (*PVRGARE *conuenit) cauentes æſtatem.*

4.8 *Tabidos cauens, ad ſupernas* PVRGATIONES *ne unquam duxeris.*

4.9 *Melancholicos autem uehementius per inferiora(*PVRGABIS*), eadem ratione contraria adhibens.*

4.10 *Medicamentis* PVRGARE *in ualde acutis (morbis) ſi(materia) turget, eadem die(conuenit:) cunctari enim in talibus malum(eſt).*

4.11 *Quibus(inſunt) tormina, & circa umbilicum labores, & lumborum dolor, qui non ſoluatur neque a medicamento* PVRGANTE *neque aliter, (ijs) in hydropem ſiccam firmatur.*

4.12 *Quibus alui lienteria laborant, (eos) hyeme per ſuperiora* PVRGARE *malum(eſt).*

4.13 *Ad elleboros(ſumendos) ijs qui non facile per ſuperiora* PVRGANTVR, *ante potionem præhumectanda ſunt corpora uberiore cibo & quiete.*

4.14 *Cum biberit quis elleborum, ad motus quidem corporis magis ducere(oportet), ad ſomnos uero & ad quietem minus: indicat autem nauigatio motum turbare corpora.*

4.15 *Cum uelis magis ducere elleborum, corpus moue; cum uero ſiſtere, ſomnum inducas, & ne moueas.*

4.16 *Elleborus periculoſus (eſt) carnes ſanas habentibus: conuulſionem enim efficit.*

4.17 *Si non febricitanti (accidant) cibi inappetentia, & cordis morſus, & uertigo, & os amarum (fuerit, eum) medicamento per ſuperiora* PVRGANTE *indigere ſignificat.*

4.18 *Dolores ſupra ſeptum tranſuerſum qui* PVRGATIONE *egent, medicamento per ſuperiora* PVRGANTE *egere ſignificant: qui uero infra, per inferiora.*

4.19 *Qui in* PVRGANTIVM *medicaminum potionibus non ſitiuit, dum* PVRGANTVR, *non deſinunt, prius, quàm ſitiuerint.*

4.20 *Non febricitantibus ſi accidant tormina & genuum grauitas & lumborum dolor, medicamento per inferiora* PVRGANTE *opus eſſe ſignificant.*

4.21 *Deiectiones nigræ, uelut i ſanguis niger, ſua ſponte prodeuntes & cum febre & ſine febre peßimæ: & quo plures & peiores colores fuerint, eo peius, cum medicamento autem melius: & quo plures colores fuerint, (eo) minus prauæ (erunt).*

4.25 *Sanguis ex ſuperioribus partibus qualiſcunque fuerit, malum;*

4.25 Ex *inferioribus uerò bonum. item ſi nigra per inferiora exeant, malum.*

4.22 *Morbis quibuslibet incipientibus, ſi bilis nigra uel ſupra uel infra exierit, letale.*

4.23 *Quibus ex morbis acutis aut ex longis aut ex uulneribus, aut alio (quouis) morbo extreme imbecillibus, bilis atra, aut qualis ſanguis niger exierit, poſtridie moriuntur.*

4.24 *Dyſenteria ſi a bile atra inceperit, letale.*

4.26 *Si ei qui dyſenteria detinetur, ueluti carnes per inferiora exierint, letale.*

4.27 *Quibus in febribus ſanguinis multitudo alicunde eruperit, ijs dum reficiuntur, alui humectantur.*

4.28 *Quibus (ſunt) bilioſæ deiectiones, (ijs) ſurditate ſuperueniente ceſſant; & quibus ſurditas, deiectionibus ſuperuenientibus ceſſat.*

4.83 *Mictio noctu multa ſi fiat, exiguam deiectionem ſignificat.*

5.1 *Conuulſio ex elleboro, letale.*

5.4 *Ex immodica* PVRGATIONE *conuulſio aut ſingultus ſi ſucceſſerit, malum.*

5.15 *Qui ex pleuritidæ empyi fiunt ſi per ſputa* PVRGANTVR *in quadraginta diebus ex quo ruptio facta fuerit, liberantur: ſi uero non, in phthiſin tranſeunt.*

5.29 *Grauidas mulieres medicamentis* PVRGARE *&c.*

5.34 *Mulieri grauidæ ſi aluus nimis fluat, periculum (eſt ei) abortiendi.*

5.36 *Mulieri menſtrua decolorata, neque eodem tempore ſemper exeuntia* PVRGATIONE

opus eſſe ſignificant.

5.61 *Si mulieri(menſtruæ)* PVRGATIONES *non &c.*

6.31 Dolores *oculorum meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut uenæ ſectio, aut* PVRGANS *medicamentum ſoluit.*

6.39 Conuulſio *fit uel ex repletione uel ex inanitione. ſic uero etiam ſingultus.*

6.47 Quibus *uenæ ſectio aut medicamentum confert, ijs uerno tempore conuenit ſanguinem mittere, aut medicamenta* PVRGANTIA *adhibere.*

7.25 EXPVRGANTIS *medicamenti potione conuulſio, letale,*

7.64 Et *quibus deiectiones ſi ſtare permiſeris, & non moueris, ſubſiſtunt ueluti ſtrigmenta: & ſi exigua fuerint, exiguus morbus fit: ſi uero multa multus. iis confert* PVRGARE *aluum. ſed ſi non purgata aluo, ſorbitiones dederis, nocebis: & quo magis dederis (eo) magis nocebis.*

7.65 Excreationes *in febribus non intermittentibus, liuidæ, & cruentæ, & bilioſæ, & fœtidæ, omnes malæ: & quæ bene excunt, bonæ tum per uentrem tum per ueſicam: & ubi aliquid quod excernitur, ſteterit non* PVRGATVM, *malum.*

7.66 Corpora *oportet, cum quis uult (ea)* PVRGARE, *fluida facere: & ſi quidem per ſuperiora, aluum ſiſtere. ſi uero per inferiora, aluum humectare.*

PVS.

2.47 *In* PVRIS *generatione dolores & febres*

(magis accidunt,quàm (iam) genito.

4.75 *Si (quis) ſanguinem aut* P V S *mingat, renum aut ueſicæ ulcerationem ſignificat.*

6.41 *Quibus ſuppuratio aliqua exiſtens in corpore,deliteſcit,iis propter craßitudinem puris aut loci deliteſcit.*

7.15 *Poſt ſanguinis ſputum* P V R I S *ſputum malum.*

7.16 *Poſt* P V R I S *ſputum,phthiſis & fluxus: cum uero ſputum retinetur,moriuntur.*

P V S T V L A.

6.9 *Latæ* P V S T V L AE *non ualdè pruriunt.*

P V T R E D O.

7.20 *Poſt eryſipelas,*P V T R E D O *aut ſuppuratio malum.*

Q V A R T A N A.

2.25 *Aeſtiuæ* Q V A R T A NAE *magna ex parte fiunt breues,autumnales uero longæ,præſertim quæ hyemem attingunt.*

5.70 *Qui a* Q V A R T A N A *capiuntur, non admodum a conuulſione capiuntur: ſi uero capiantur prius,deinde ſucceſſerit* Q V A R T A N A, *liberantur.*

Q V O T I D I A N V S.

3.17 Q V O T I D I A N AE *autem conſtitutiones &c.*

L. C O N S T I T V T I O.

R A T I O.

2.52 *Omnia ſecundum* R A T I O N E M *facienti*

& (ipſis) non ſuccedentibus ſecundum RATIONEM, non eſt tranſeundum ad aliud, manente eo quod principio uiſum fuerit.

RAVCITAS.

2.40 RAVCITATES & grauedines ualde ſenibus non concoquuntur.

RECIDIVA,

2.12 Quæ relinquantur in morbis poſt iudicationem, RECIDIVAS facere conſueuerunt.

4.36 Sudores febricitantibus ſi inceperint, boni, tertio (die) & quinto & ſeptimo & nono & undecimo et quartodecimo et decimoſeptimo et uigeſimoprimo & uigeſimoſeptimo & .31. & trigeſimoquarto ii enim ſudores morbum indicant; qui autem non ſic eueniunt, laborem ſignificant, & longitudinem morbi & RECIDIVAS.

4.61 Febricitantem niſi imparibus diebus febris dimiſerit, (ea) redire ſolet.

REFECTIO.

1.3 REFECTIONES quæ in extremo fuerint, (ſunt) periculoſæ.

REFRIGERO.

Quæ REFRIGERATA ſunt, ea excalfacere oportet, præter ea quæ ſanguinem fundunt, aut fuſura ſunt.

REFRIGERATIO.

5.69 REFTIGERATIONES incipiunt mulieribus quidem & lumbis magis & per dorſum ad caput, uiris autem magis in poſteriore quàm in ante-

riore parte corporis,ut in cubitis & coxis.ſed & cutis horum (eſt) rara.oſtendit autem id pilus.

REGIVS MORBVS. L. I. C. T. ERICVS.

4.62 *Quibus in febribus morbus* REGIVS *ſuperuenit ante diem ſeptimum;malum.*

4.64 *Quibus in febribus ſeptimo uel nono uel undecimo uel quartodecimo morbus* REGIVS *ſucceſſerit,bonum ; niſi dextrum hypochondrium durum fuerit:ſi uero non , malum , (&)non bonum.*

RELINQVO.

2.12 *Quæ* RELINQVVNTVR *in morbis poſt criſin,recidiuas facere conſueuerunt.*

RENES.

4.76 *Quibus in urina craſſa exiſtente carunculæ exiguæ aut ueluti capilli una exeunt,ijs a* RENIBVS *excernuntur.*

4.78 *Quicunque repente ſanguinem mingunt,iis a* RENIBVS *uenulæ ruptionem ſignificat.*

5.58 RENIBVS *ſuppuratis ſuccedit urinæ ſtillicidium &c.*

6.6 RENVM *& ueſicæ uitia difficulter ſanantur ſenioribus.*

6.11 *Melancholicis &* RENVM *morbo affectis ſi hæmorrhoides ſucceſſerint,bonum.*

7.34 *Quibus in urinis ſuperſtant bullæ,(iis)*RENALEM *ægritudinem & longam fore ſignificant.*

7.35 *Quibus uero pinguis (in urinis) inſidentia*

& conferta, iis R E N V M *uitia & acuta ſignificat.*

7.36 *Quibus autem nephriticis prædicta acci- dunt ſigna doloresq́; circa ſpinæ muſculos fiunt, ſiqui- dem circa loca exteriora fiant, abſceſſus etiam exterio res fore expecta: ſi uero magis dolores circa loca in- teriora fiant, abſceſſum quoque interiorem magis fore expecta.*

REPLETIO.

1.4 *Etenim* REPLETIONES *extremæ, graues.*

2.4 *Non* REPLETIO, *non fames neque aliud quicquam bonum (eſt), quod nimium a natura ex- ceſſerit.*

6.39 *Conuulſio fit uel a* REPLETIONE *uel ab inanitione: ſimiliter uero & ſingultus.*

2.22 EX REPLETIONE *morbos quicunque contingerint, ſanat euacuatio; & quicunque ex eua- cuatione,* REPLETIO, *item aliorum (oppoſito- rum) oppoſitio.*

RESPIRATIO.

6.54 *In acutis morbis qui cum febre exiſtunt, lu- ctuoſæ* RESPIRATIONES, *malum.*

4.68 *In febribus ſpiratio offendens malum: conuul ſionem enim ſignificat.*

RIGOR.

4.29 *Quibus in febribus ſexto die* RIGORES *fiunt, difficilis (ſunt) iudicii.*

4.46 *Si* RIGOR *incidit febre non deficiente ægro iam imbecillo, letale.*

4.58 Ei qui ardente(febre)laborat, ſi RIGOR ſuperuenerit,(morbi fit)ſolutio.

4.63 Quibus in febribus quotidie RIGORES eueniant,quotidie febres ſoluuntur.

7.7 Ex multa potatione(uini) RIGOR & deſipientia malum.

RISVS.

6.53 Deliria quæ cum RISV fiunt,tutiora; quæ uero ſerio,periculoſiora.

RVPTIO.

6.22 Quicunque ex RVPTIONIBVS dolores a dorſo ad cubitus deſcendunt, eos uenæ ſectio ſoluit.

SANGVIS.

4.25 SANGVIS per ſuperiora quidem qualiſcunque fuerit,malum,per inferiora autem bonum:& deiectiones nigræ malum.

4.23 Quibus in febribus SANGVINIS multitudo alicunde eruperit,ijs dum reficientur, alui humectantur.

4.60 Quibus in febribus aures obſurduerint,(ijs) SANGVIS e naribus fluens aut aluus turbata morbum ſoluit.

4.74 Quibus ſpes eſt ad articulos fore abſceſſum, liberat ab abſceſſu urina quæ fit multa et craſſa & alba,ut in laborioſis febribus quarto die nonnullis fieri incipit, ſi uero & ex naribus SANGVIS fluxerit,& breui admodum ſoluitur(æger).

4.75 Si(quis)SANGVINEM aut pus mingat

renum aut ueſicæ ulcerationem ſignificat.

4.78 *Quicunque repente* SANGVINEM *mingunt, ijs a renibus uenulæ ruptionem ſignificat.*

4.80 *Si (quis)* SANGVINEM *mingat, & grumos, & urinæ ſtillicidium habeat, & dolor incidat ſuper imum uentrem & pectinem & interfœmineum ea quæ circa ueſicam ſunt, laborant.*

4.81 *Si (quis)* SANGVINEM *& pus mingat ſquamulasq́; & odor grauis fuerit, ueſicæ ulcerationem ſignificat.*

5.3 SANGVINE *multo fluente, ſi conuulſio aut ſingultus ſucceſſerit, malum.*

5.13 *Qui* SANGVINEM *ſpumoſum expuunt, ijs ex pulmone talis reiectio fit.*

5.19 *Quæ refrigerata ſunt, (ea) excalfacere oportet, præter ea quæ* SANGVINEM *fundunt, aut fuſura ſunt.*

5.23 *In ijs oportet frigida uti, unde* SANGVIS *large effluxurus eſt, non ſuper ipſas partes, ſed circa ipſas, unde profluit. item quæcunque inflammationes aut efferueſcentiæ ad rubrum & ſubcruentum uergentes recenti* SANGVINE *ſuper his quippe ueteres denigrat. & eryſipelas non ulceratum (curat), nam ulceratum lædit.*

6.22 *Quicunque ex ruptionibus dolores e dorſo ad cubitus deſcendunt, (eos) ſoluit* SANGVINIS *miſsio.*

6.31 *Dolores oculorum meri potio, aut bal-*

neum aut fomentum aut SANGVINIS *miſsio aut purgans medicamentum ſoluit.*

7.46 Ad Dolores oculorum *ubi merum biberis, & multa calida laueris,* SANGVINEM *mittito.*

6.36 Dyſuriam *ſoluit* SANGVINIS *miſsio: incidere autem (oportet) interiores (in cruribus uenas).*

6.47 *Quibus* SANGVINIS *miſsio aut purgans medicamentum confert, iis uerno tempore conuenit* SANGVINEM *mittere, aut purgans medicamentum exhibere.*

7.9 *Poſt* SANGVINIS *fluxum delirium aut etiam conuulſio, malum.*

7.15 *Poſt* SANGVINIS *ſputum puris ſputum malum.*

7.21 *Poſt uehementem pulſum in ulceribus,* SANGVINIS *(fit) multa eruptio.*

7.37 *Qui* SANGVINEM *uomunt, ſi ſine febre, ſalubre (eſt); ſin cum febre, malum. curare autem (ipſos oportet) adſtringentibus & refrigerantibus.*

5.24 *Frigida, ueluti nix & glacies, pectori (ſunt) inimica, tuſſes mouent,* SANGVINIS *fluxum faciunt, & catarrhos.*

5.31 *Mulier grauida, ſi ei* SANGVIS *mittatur, abortit, & magis ſi maior fuerit factus.*

5.32 *Mulieri* SANGVINEM *uomenti ſi menſtrua eruperint, (mali fit) ſolutio.*

5.33 *Mulieri menſtruis deficientibus ſi* SANGVIS *e naribus fluxerit, bonum.*

5.40 *Mulieribus quibus ad mammas* SANGVIS

conuoluitur, maniam ſignificat.

5.64 *Lac præterea malum eſt iis quibus in acutis febribus billioſæ ſunt deiectiones, & quibus* SANGVINIS *multi deiectio facta eſt. &c.*

6.20 *Si in cauitatem (aliquam)* SANGVIS *præter naturam effuſus fuerit, neceſſe eſt corrumpatur.*

7.48 *Stranguriam & dyſuriam uini potio &* SANGVINIS *miſſio ſoluit. incidere autem (oportet) interiores (in cruribus uenas).*

7.74 *Poſt* SANGVINIS *uomitum phthiſis & puris per ſuperiora purgatio; poſt phthiſin fluxio ex capite, poſt fluxionem diarrhœa, poſt diarrhœam retentio per ſuperiora purgationis; poſt retentionem mors.*

7.75 *Poſt* SANGVINIS *ſputum, puris ſputum & fluxio: ubi uero ſaliua retinetur, moriuntur. &c.*

SANVS.

2.36 *Qui* SANO *ſunt corpore ſi medicamentis purgantur, exoluuntur celeriter; item qui prauo utuntur cibo.*

4.16 *Iis qui* SANO *ſunt corpore, periculoſus eſt elleborus: conuulſionem enim inducit.*

6.51 *Quibus* SANIS *dolores in capite repente fiunt, & ſtatim obmuteſcunt, & ſtertunt, moriuntur in ſeptem diebus, niſi febris eos apprehenderit.*

SATIETAS. L. REPLETIO.

2.4 *Non* SATIETAS, *non fames neque aliud*

quicquam bonum (eſt) quod naturam exceſſerit.

SECVNDAE.

5.49 VT SECVNDAE *excidant, ſternutatorio appoſito apprehende nares & os.*

SEDIMENTA. L. SVBSIDENTIAE.

SEMEL.

1.17 *Et quibus* SEMEL *(dare cibum oporteat) aut bis & plura ne an pauciora & particulatim, (conſiderandum). dandum uero aliquid & conſuetudini et tempori & regioni & ætati.*

SENES.

1.13 SENES *facillime ieiunium tolerant, ſecundo loco ætate florentes, minime adoleſcentes, omnium uero minime pueruli: ſed ex iis ipſis quicunque cæteris promptiores fuerint.*

1.14 SENIBVS *uero parum caloris (ineſt): propterea paucis alimentis indigent, a multis enim extinguitur. ob eam rem etiam febres* SENIBVS *nõ ſimiliter acutæ accidunt: frigidum enim (eſt eorum) corpus.*

2.39 SENES *magna ex parte minus quàm iuuenes ægrotant: quicunque autem ipſis longe morbi acciderint, ſæpe (eos) ad mortem comitantur.*

2.40 *Raucitates & grauedines ualde ſenibus non concoquuntur.*

3.12 SENIORIBVS *uero (accidunt) catarrhi, breui interimentes.*

3.31 SENIBVS *antea (accidunt) ſpirandi difficultates, catarrhi tuſsiculoſi, ſtranguriæ, dyſuriæ, articu-*

articulorũ & renis dolores, uertigines, apoplexiæ, mali habitus (corporis), pruritus totius corporis, uigiliæ, alui & oculorum et narium humiditates, oculorũ etiam hebetudines & glaucedines, & auditus graues.

7.41 Si SENIORIBVS qui immodice purgantur, ſingultus ſuperuenerit, non bonum.

SEPTVM TRANSVERSVM.

4.18 Dolores ſupra SEPTVM TRANSVERSVM quicunque purgatione egent, medicamento per ſuperiora purgante opus eſſe ſignificant; qui uero infra, per inferiora.

6.18 SEPTVM TRANSVERSVM diſciſſum, letale.

7.54 Quibus inter SEPTVM TRANSVERSVM & uentrem phlegma reſidet & dolorem dat, ut pote quod exitum non habeat ne ad alterum quidem uentrem, iis per uenas ad ueſicam uerſo phlegmate, ſolutio fit morbi.

SERIO.

6.53 Deliria quæ cum riſu fiunt, tutiora; quæ uero SERIO, periculoſiora,

SICCITAS. L. HYEMS, VER, AESTAS, AVTVMNVS.

7.3 In SICCITATIBVS febres acutæ fiunt & ſi quidem maiori ex parte annus talis extiterit, qualem fecit conſtitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet.

3.15 Inter anni cõſtitutionẽ in ſumma SICCITATES imbribus ſunt ſalubriores & minus letales

3.16 In SICCITATIBVS autem (ſiunt morbi) tabidi, ophthalmiæ, arthritides, ſtranguriæ & dyſenteriæ.

SINGVLTVS.

5.3 Sanguine multo fluente, conuulſio aut SINGVLTVS ſi ſucceſſerit, malum.

5.4 Poſt immodicam purgationem, conuulſio, aut SINGVLTVS ſi ſucceſſerit, malum.

5.58 Si uero hepar inflammatione laborat, SINGVLTVS ſuccedit.

6.13 SINGVLTIENTI ſi ſternutamenta ſucceſſerint, ſoluunt SINGVLTVM.

6.39 Conuulſio fit uel a repletione, uel ab inanitione: ſic uero etiam SINGVLTVS.

7.3 Poſt uomitum, SINGVLTVS & oculi rubri, malum.

7.10 Poſt ileon, SINGVLTVS, malum.

7.17 Poſt inflammationem hepatis, SINGVLTVS, malum.

7.41 Si ſenioribus, qui immodice purgantur, SINGVLTVS ſuperuenerit, non bonum.

SITIBVNDVS. SITICVLOSVS.

5.64 SITIBVNDIS (lac dare malū eſt) &c.

4.54 Quibus diu (durant) tuſſes ſiccæ breui irritantes in febribus ardentibus, (ii) non admodum SITICVLOSI exiſtunt.

SITIO.

4.19 Qui in medicamentorum potionibus non SITIVNT, dum purgantur, (ij) nō ceſſant, priuſquàm

SITIVERINT.

SOLVO.

2.42 SOLVERE *apoplexiam uehementem, impoßibile eſt; debilem uero non facile.*

SOMNVS.

2.1 *In quocunque morbo* SOMNVS *laborem infert, letale; ſi uero* SOMNVS *iuuat, non letale.*

2.2 *Vbi deſipientiam* SOMNVS *ſedauerit, bonum.*

2.3 *Si uterque* SOMNVS *& uigilia immodice eueniant, malum.*

7.67 L. ELLEBORVS.

4.41 *Sudor multus ex* SOMNO *ſine ulla alia cauſa eueniens, corpus uti pluri cibo ſignificat: ſi uero cibum non capienti id accidat, euacuatione egere ſignificat.*

4.67 *In febribus ex* SOMNO *pauores, uel conuulſiones, malum.*

SPASMVS. L. CONVVLSIO.

SPES.

4.74 *Quibus* SPES *eſt ad articulos fore abſceſſum, liberat ab abſceſſu urina quæ multa & craſſa & alba exeat, qualis in laborioſis febribus quarto die aliquibus exire incipit: ſi uero & ex naribus ſanguis fluxerit, etiam breui admodum liberatur (ægrotus).*

SPINA. L. NEPHRITICVS.

7.36 *Dolores circa* SPINAE *muſculos. &c.*

SPIRITVS. SPIRATIO.

4.50 *Vbi in febre non intermittente* SPIRITVS *difficultas acciderit, & deſipientia, letale (eſt).*

4.68 *In febribus* SPIRITVS *ſubſiſtens, malum: conuulſionem enim ſignificat.*

SPVMA. SPVMOSVS.

2.43 *Qui ſtrangulantur & reſoluuntur, non dum tamen mortui ſunt, non redeunt ad uitam, quibus* SPVMA *circa os fuerit.*

5.13 *Qui ſanguinem* SPVMOSVM *expuunt; ijs ex pulmone talis reiectio fit.*

7.30 *Quibus* SPVMOSA *excrementa in diarrhœis (ſunt), ijs a capite phlegma defluit.*

SPVTVM.

2.12 *In pleuriticis* SPVTVM *ſi ſtatim appareat, incipiente (morbo), (morbum ipſum) breuem facit: ſi uero poſt, appareat, producit. &c.*

5.11 *Iis quibus a phthiſibus uexantur ſi* SPVTVM *quod extuſſierint grauiter oleat ſuper carbones infuſum, & capilli a capite fluant, letale.*

7.15 *Poſt ſanguinis* SPVTVM, *puris* SPVTVM, *malum.*

7.16 *Poſt puris* SPVTVM *phthiſis & fluxus; cum uero* SPVTVM *retinetur moriuntur.*

5.62 STERILES *mulieres.*

5.63 STERILES *uiri.*

STERNVTAMENTVM.

6.13 *Singultienti* STERNVTAMENTA *ſi ſucceſſerint, ſoluunt ſingultum.*

7.51 STERNVTAMENTVM *ſit ex capite, excalfacto cerebro, aut humectata parte in capite uacua; ſuſtollitur enim extra aer, qui intus continetur: & ſonitum edit, quòd per anguſtum ipſi exitus ſit.*

6.51 STERTO. L. MVTVS.

STILLICIDIVM VRINAE. L. STRANGVRIA.

STANGVLARI.

2.43 *Qui* STRANGVLANTVR *& reſoluuntur, non dum tamen mortui ſunt non redeunt ad uitam quibus in ore ſpuma fuerit.*

4.34 *Si febricitanti, tumor non exiſtente in faucibus,* STRANGVLATIO *ſubito accidat, letale.*

STRANGVRIA. *l. ſtillicidium urinæ.*

5.58 *Recto inteſtino & utero inflammatione affectis & renibus purulentis,* STRANGVRIA *ſuccedit, hepati uero inflammatione laboranti, ſingultus ſuccedit.*

6.44 *Quibus poſt* STRANGVRIAM *ileos ſuccedit, in ſeptem diebus moriuntur, niſi febre ſubſecuta, ſatis urina fluxerit.*

7.48 STRANGVRIAM *& dyſuriam, uini potio et ſanguinis miſſio ſoluunt: incidere autem (oportet uenas in cruribus) internas.*

STVPOR.

7.14 *Poſt ictum capitis,* STVPOR *aut deſipientia, malum.*

4.79 Quibus in urina arenoſæ ſunt SVBSI-DENTIAE, iis ueſica calculo laborat.

7.31 Quibus febricitantibus in urinis SVBSI-DENTIAE ueluti farinæ craßiores exeunt, longum morbum ſignificant.

7.32 Quibus uero bilioſæ SVBSIDENTIAE (nunc ſunt) quæ antea (fuerunt) tenues, acutam ægritudinem ſignificant.

7.35 Quibus (in urinis eſt) inſidentia & conferta, iis nephritica & acuta ſignificat.

SVDOR.

2.12 Item urinæ, & (alui) excrementa, & SVDORES ſi ſuperuenerint, indicant morbos & difficiles iudicatu & faciles, & breues & longos.

3.6 Quando æſtas fuerit ueri ſimilis SVDORES in febribus expectare oportet.

4.36 SVDORES febricitantibus ſi inceperint boni, die tertio & quinto ſeptimo & nono & undecimo & quartodecimo & decimoſeptimo & duodecimo & uigeſimoſeptimo & trigeſimoprimo, & 34. hi enim ſudores morbum iudicant: qui uero non ita eueniunt, laborem ſignificant & longitudinem morbi & recidiuam.

4.37 Frigidi SVDORES ſi cum acuta febre eueniant, mortem ſignificant; cum mitiore uero, morbi longitudinem.

4.38 Et ubi SVDOR in corpore ineſt, ibi morbum nunciat.

4.41 SVDOR multus ex ſomno ſine ulla alia cauſa eueniens, corpus uti pluri cibo ſignificat: ſi uero cibum non capienti id accidat, eum euacuatione egere ſignificat.

4.42 SVDOR multus frigidus uel calidus ſemper fluens frigidus longiorem, calidus breuiorem morbum ſignificat,

7.4 Poſt SVDOREM horror, non bonum.

7.61 SVDOR multus calidus aut frigidus ſemper fluens ſignificat habere humoris copiam. deducere ergo oportet robuſto quidem per ſuperiora, imbecillo autem per inferiora.

SVPPVRATIO. L. EMPYEMA.

SVPPVRO. L. EMPYI.

5.10 Qui anginam effugiunt, ad pulmonem iis [illegible]titur, & intra ſeptem dies moriuntur: ſi uero hos (dies) effugerint, SVPPVRANTVR.

5.47 Si uterus in ea parte qua coxæ adiacet, SVPPVRATVS fuerit, neceſſe eſt emmoton fieri.

6.41 Quibus SVPPVRATIO aliqua in corpore exiſtens non apparet, iis propter craßitudinem puris uel loci non apparet.

7.20 Poſt eryſipelas putredo aut SVPPVRATIO, malum.

7.22 Poſt longum uentris dolorem (fit) SVPPVRATIO.

7.38 Catarrhi in uentrem ſuperiorem, SVPPVRANTVR in uiginti diebus.

7.44 Qui SVPPVRATI uruntur aut ſecan

tur, ſi pus quidem purum fluxerit & album, euadunt ſi uero ſubcruentum, & fæculentum & fœtidum, moriuntur.

7.45 Qui hepate SVPPVRATO uruntur aut ſecantur, ſi pus quidem purum fluxerit & album, euadunt, in tunica enim iјs pus continetur; ſi uero ueluti amurca fluxerit, moriuntur.

SVRDITA.

4.28 Quibus biliosæ deiectiones (ſunt), iјs SVRDITATE ſuperueniente deſinunt: & quibus SVRDITAS (eſt), iјs biliosis deiectionibus ſuperuenientibus deſinit.

4.60 Quibus in febribus aures obſurduerint, iјs ſi ſanguis e naribus fluxerit, aut aluus deturbata fuerit, morbum ſoluit.

SVSPIRIVM. L. RESPIRATIO.

5.9 TABES. L. PHTHISIS.

TABIDVS. L. PHTHISICVS.

TEMPERATVS.

2.37 TEMPERATA corpora habentes, medicamentis ut purgentur, ſunt difficiles.

TEMPVS.

3.4 In TEMPORIBVS quando eodem die modo calor modo frigus fit, autumnales morbos expectare oportet.

3.8 In moderatis TEMPORIBVS cum tempeſtiua tempeſtius fiunt, morbi ſtabiles & boni iudicij fiunt, in immoderatis autem inſtabiles & mali iudicii.

3.11 *Inter anni* TEMPORA *ſiquidem hyems ſicca & borealis euenerit, uer autem pluuium & auſtrale, neceſſe eſt æſtate febres acutas & ophthalmias & dyſenterias fieri, præſertim mulieribus & uires natura humidis.*

TENESMVS.

7.27 *Mulieri grauidæ ſi* TENESMVS *accide rit, eam abortire facit.*

TENVIS. L. GRACILIS.

TERTIVS.

4.43 *Febres quæ non intermittunt,* TERTIO *quoque die ſi fortiores fiunt, periculoſæ; quoquo autem modo intermiſerint, ſine periculo eſſe ſignificant.*

TERTIANA.

4.59 TERTIANA *exquiſita in ſeptem circuitibus, cum longiſſime, iudicatur.*

4.67 *In febribus ex ſomno* TIMORES *aut conuulſiones malum.*

TIMOR.

6.23 *Si* TIMOR *& mœſtitia longo tempore perſeuerent, melancholicum tale (eſt).*

TORMINA.

4.11 *Quibus (ſunt)* TORMINA *& circa umbilicum dolores, & lumborum angor, qui non ſoluatur neque a medicamento purgante neque aliter, (ijs) in hydropem ſiccam firmatur.*

TREMOR.

6.26 *Quibus in (febribus) ardentibus* TREMORES *fiunt, iis delirium ſuccedit.*

4.44 *Quibus febres longæ, iis aut* TVBERCVLA, *aut circa articulos dolores fiunt.*

4.45 *Quibus* TVBERCVLA *aut circa articulos dolores ex longis febribus fiunt, ii cibis pluribus utuntur.*

4.82 *Quibus in urinaria fiſtula* TVBERCVLVM *fit, iis ſuppuratione facta & eruptione (mali fit) ſolutio.*

7.8 *Poſt* TVBERCVLI *interruptionem exolutio, uomitus, & animi dectus, eueniunt.*

7.57 *Quibus in urinaria fiſtula* TVBERCVLA *fiunt, iis ſuppuratione facta & eruptione, ſoluitur dolor.*

TVMOR.

5.25 *In articulis* TVMORES *& dolores ſine ulcere etiam podagricos & conuulſiones, horum plurimos frigida multa ſuperfuſa liberatq; & eminuit & dolorem ſoluit. ſtupor nanque mediocris dolorem ſoluit.*

5.65 *Quibus* TVMORES *in ulceribus apparent, non admodum conuelluntur, neque inſaniunt; iis autem repente euaneſcentibus quibus à tergo (ſunt ulcera) conuulſiones & diſtentiones (accidunt); quibus uero ante, maniæ aut dolores lateris acuti, aut empyeſis aut dyſenteria, ſi rubri fuerint tumores.*

5.66 *Si (in) uulneribus prauis & magnis* TVMORES *non appareant, magnum malum (eſt).*

5.67 *Molles (*TVMORES*) boni, crudi ue*

ro mali.

6.37 *Ab angina correpto ſi* TVMOR *fit in col lo, bonum.*

L. ANGINA.

7,49 *Ab angina correpto* TVMOR *& rubor ſi in pectore ſuperuenerint, bonum: foras enim uertitur morbus.*

TVSSIS.

4.54 *Quibus* TVSSES *diu ſiccæ in ardentibus febribus breui irritantes, (ii) non admodum ſiticuloſi ſunt.*

6.35 *Hydropicis ſi* TVSSIS *ſuperuenerit malum.*

6.46 *Qui gibbi ex aſthmate aut* TVSSI *fiunt ante pubertatem, moriuntur.*

7.47 *Hydrope laborantem ſi* TVSSIS *corripiat, (is) deſperatus eſt.*

V|ACVARE. L. EVACVATIO. L. PVRGARE.

2.51 *Plurimum & repente* VACVARE *& replere, aut calefacere, aut infrigidare, aut aliter quomodocunque corpus mouere periculoſum (eſt), & (enim) omne nimium naturæ (eſt) inimicum. quod uero paulatim (fit) tutum (eſt), præſertim ſi quis ex una re in aliam tranſeat.*

VACVATIO.

1.2 *Vaſorum* VACVATIO *ſi qualis oportet fieri fiat &c.*

1.3 VACVATIONES *quæ ad extremum*

ducunt, periculoſæ &c.

2.21 EX *repletione morbos quicunque contigẽrint, ſanat* VACVATIO; *et quicũque ex* VACVATIONE *repletio; item aliorũ (oppoſitorũ) oppoſitio.*

4.41 *Sudor multus ex ſomno ſine ulla alia cauſa eueniens, corpus uti puri cibo ſignificat: ſi uero cibum non capienti id accidat, cum* VACVATIONE *egere ſignificat.*

VARICES.

6.21 *Ex melancholia inſanientibus ſi* VARICES *aut hæmorrhoides ſuperuenerint, inſaniæ (fit) ſolutio.*

6.34 *Quibus capilli defluxerunt, iis* VARICES *magni non fiunt; quibus uero capillis defluxis* VARICES *ſucceſſerint, denuo iis capilli naſcuntur.*

VENTER.

1.2 *In perturbationibus* VENTRIS *& uomitibus qui ſua ſponte eueniunt ſi qualia purgare oportet, purgantur; confertq́; & leuiter ferunt; ſin minus contra: ſic & uaſorum euacuatio, ſi qualis fieri oportet, fiat, confertq́; & bene ſe habeat; ſin minus contra. habere ergo oportet rationem & regionis & temporis & ætatis & morborũ, in quibus oportet, aut non.*

1.15 VENTRES *hyeme & uere natura calidiſſimi & ſomni longiſſimi (exiſtunt). in ijs igitur temporibus etiam plura alimenta exhibenda: etenim calorem innatum maiorem habent. pluri itaque alimento indigent: indicio ſunt ætates & athletæ.*

6.7 *Dolores & tumores qui in* VENTRE *fiunt ſublimes, leuiores ſunt, non ſublimes autem, ue-*

hementiores.

7.38 *Catarrhi in* VENTREM *ſuperiorem (id eſt thoracem) ſuppurantur in diebus uigi ıti.*

7.22 *Poſt dolorem diuturnum* VENTRIS *fit ſuppuratio.*

7.26 *Poſt dolorem* VENTRIS *uehementem, extremarum partium frigiditas, malum.*

VENTRICVLVS.

4.65 *In febribus circa* VENTRICVLVM *æſtus uehemens & cordis morſus, malum.*

6.18 VENTRICVLVS *diſciſſus, letale.*

VER.

2.15 *Ventres hyeme &* VERE *natura calidiſsimi & ſomni longiſsimi (exiſtunt). &c.*

3.6 *Quando æſtas fuerit* VERI *ſimilis, ſudores in febribus expectare op:rtet.*

3.9 *Autũno morbi acutiſsimi atq; exitioſiſsimi omnino (fiũt)* VER *aũt ſaluberrimũ & minime exitiale.*

3.11 *Inter anni autem tẽpora ſiquidẽ hyems ſicca et aquilonia fuerit,* VER *aũt plurimũ et auſtrale, neceſſe eſt æſtate febres & ophthalmias & dyſenterias fieri, præcipue mulieribus & uiris natura humidis.*

3.12 *Si uero auſtralis hyems & pluuioſa fuerit,* VER *aũt ſiccũ et aquiloniũ, mulieres quibus partus ad uer (imminẽt), ex qualibet cã abortiũt: quæcũq; aũt in utero geſtauerint, imbecillos & morboſos infantes pariũt, ita ut uel ſtatim intereãt, uel inualidi et morboſi uiuãt: alijs uero dyſenteriæ & ophthalmiæ ſiccæ eueniunt; ſenioribus aũt catarrhi breui interimẽtes,*

3.18 Per anni autem tempora, V E R E quidem & prima æſtate pueri, & qui eos ætate ſequuntur, optime degunt, & ualent maxime; æſtate uero & autumno aliquantiſper ſenes; reliquo autem (tempore, uidelicet) hyemis qui medii (ſunt) inter has ætates.

3.20 V E R E ſiquidem (accidunt &) maniæ, & melancholiæ, & epilepſiæ & ſanguinis fluxus & anginæ & grauedines & raucitates & lepræ & tuſſes & lichenes & alphi & puſtulæ ulceroſæ plurimæ et tubercula & articulorum dolores.

6.55 Podagrici morbi V E R E & autumno mouentur ut plurimum.

6.47 Quibus ſanguinis miſsio aut medicamentum purgans confert, iis V E R E conuenit ſanguinem mittere aut medicamentum purgans exhibere.

V E S I C A.

4.77 Quibus in urina craſſa, ſimul exeunt furfures (quidam), iis V E S I C A ſcabie laborat.

4.79 Quibus in urina, arenoſa (quædam) ſubſidunt, iis V E S I C A laborat calculo.

6.6 Renum uitia & quicunque ſunt in V E S I C A dolores, difficulter ſanantur ſenioribus.

6.18 Cui V E S I C A diſciſſa fuer[illegible] brum, aut cor, aut ſep[illegible]um tranſuerſum, [illegible] ex inteſtinis tenuibus aut uentriculus aut [illegible] le (eſt).

4.80 Si (quis) mingat ſanguinem & grum[illegible] ſtranguriam habeat, & dolor incidat ad inte[illegible] neum & imum uentrem & pectinem, V E S[illegible]

CAM ægrotare ſignificat.

7.63 Quæ per VESICAM excernuntur, inſpicere oportet, num (talia ſunt) qualia ſanis excernuntur. Quæ igitur minime ſimilia iis (ſunt), ea morboſiora; quæ uero ſanis ſimiliora, (ea) minime morboſa.

7.75 Qualia etiam in excrementis quæ fiunt per VESICAM & per aluum & per carnes, & ſicubi aliter a natura corpus exceſſerit, ſi parum, paruus morbus fit; ſi multum, multus; ſi permultum, id letale (eſt).

VICTVS.

1.4 Tenuis & exquiſitus VICTVS & in longis morbis ſemper & in acutis ubi non competit, (eſt) periculoſus. & rurſus VICTVS qui ad extremam tenuitatem peruenit (eſt) moleſtus, etenim repletiones quæ ad extremum deuenerunt, moleſtæ (ſunt).

1.5 In tenui VICTV peccant ægrotantes: quare magis læduntur. quicunque enim error fit, maior fit in tenui quàm in paulo pleniore VICTV. propterea etiam ſanis periculoſus (eſt) admodum tenuis & conſtitutus & exquiſitus VICTVS, quod errores grauiu[illegible]runt. hac igitur de cauſa tenuis & exquiſi[illegible]TVS periculoſior (eſt) ut plurimum pau[illegible]

1.7 [illegible] igitur peracutus eſt morbus, ſtatim ſum[illegible]es habet, & ſumme tenuiſsimo VICTV [illegible] eſt: ubi uero non, ſed licet pleniorem VI[illegible]M adhibere, tantum (a tenui VICTV) decli[illegible]m, quanto morbus leuior extremis fuerit.

1.8 *Cum uiget morbus, tunc tenuiſsimo* VICTV *uti neceſſe eſt.*

1.9 *Conijcere autem oportet num æger ad uigorem morbi(cũ)*VICTVM *perferat, & an ille prius deficiat, & (cum)*VICTVM *non perferat, an morbus prius deficiat & hebeſcat.*

1.10 *Quibus igitur ſtatim uigor(eſt), ſtatim tenuiter cibus eſt dandus; quibus uero poſtea uigor futurus eſt, (ijs &)in eo(uigore)& paulo ante eum (cibus)ſubtrahendus eſt. antea uero uberior cibus eſt dandus, ut æger perferre poſsit.*

1.16 VICTVS *humidus omnibus febricitantibus confert, præcipue autem pueris & alijs qui eiuſmodi uictu uti conſueuerunt.*

1.17 *Et quibus ſemel aut bis(ſit cibus offerẽdus) & plura ne an pauciora & particulatim, (conſiderandum): dandum uero aliquid & conſuetudini, & tempori, & regioni & ætati.*

VIGILIA.

2.3 *Somnus,* VIGILIA, *utraque ſi immoderata fuerint, malum.*

7.18 *Poſt* VIGILIAM, *conuulſio, aut deſipientia, malum.*

VIGOR. L. VICTVS.

VINVM.

2.21 *Famem* VINI *potio ſoluit.*

7.48 *Stranguriam & dyſuriam* VINI *potio et ſanguinis miſsio ſoluunt: incidere uero internas(in cruribus)uenas oportet.*

7.56 *Anxie-*

7.56 *Anxietudinem, oſcitationem, horrorem,* VINVM *æquale æquali (aquæ mixtum epotum, ſoluit morbum.*

VISCERA.

4.66 *In febribus acutis conuulſiones & dolores circa* VISCERA *uehementes, malum.*

VITA.

1.1 VITA *breuis, ars longa, occaſio præceps, experimentũ periculoſum, iudiciũ difficile. oportet & aũt non ſolum (medicum) ſeipſum præſtare ut ea quæ oportet, faciat, ſed & ægrum, & aßidentes, & exteriora.*

VLCVS.

5.20 VLCERIBVS *frigida mordax, cutem obdurat, dolorem inſuppurabilem facit, denigrat, rigores febriles facit, & conuulſiones, & diſtentiones.*

5.65 *Quibus tumores in* VLCERIBVS *apparent, non admodum conuelluntur, neque inſaniunt: ijs autem repente euaneſcentibus quibus a tergo (ſunt* VLCERA), *conuulſiones & diſtentiones (accidunt); quibus uero ante, maniæ aut dolores lateris acuti, aut empyeſis aut dyſenteria, ſi rubri fuerint tumores.*

6.4 VLCERA *circum circa glabra, maligna (ſunt).*

6.8 *Hydropicis* VLCERA *quæ in corpore fiũt, non facile ſanantur.*

6.45 VLCERA quæcunque annua fiunt, aut longiore tempore durant, neceſſe eſt os abſcedere, & cicatrices cauas fieri.

7.21 Poſt uehementem pulſum in VLCERIBVS, ſanguinis (fit) multa eruptio.

VMBILICVS.

2.35 In omnibus morbis partes ad VMBILICVM & imum uentrem attinentes craßitudinem habere melius eſt; multum autem extenuari & contabeſcere, malum (eſt): periculoſum uero hoc idem & ad purgationes quæ per inferiora fiunt.

4.11 Quibus (inſunt) inteſtinorum dolores & circa VMBILICVM labores & lumborum angor, qui non ſoluatur neque a purgante medicamento neque aliter; (ijs) in hydropem ſiccam firmatur. (ideſt tympaniam).

VOMITVS.

1.2 In perturbationibus uentris & VOMITIBVS ſpontaneis, ſi qualia oportet purgari, purgentur, & confert & facile ferunt; ſin minus, contra. ſic & uaſorum euacuatio, ſi qualis oportet fieri, fiat, & confert & bene ſe habent; ſin minus, contra: habere igitur oportet rationem & regionis & temporis & ætatis & morborum, in quibus oportet, aut non.

4.6 Graciles & ad VOMITVM faciles per ſuperiora purgare (oportet), cauentes hyemem.

4.7 Ad VOMITVM autem difficiles & mediocriter carnoſos per inferiora purgare, cauentes æ-

ſtatem.

6.15 *Diarrhœa longa laboranti ſi* VOMITVS *ſua ſponte ſucceſſerit, ſoluit diarrhœam.*

7.3 *Poſt* VOMITVM *ſingultus & oculi rubri malum.*

7.8 *Poſt tuberculi interni ruptionem exolutio,* VOMITVS *& animi defectus eueniunt.*

7.10 *Poſt ileon* VOMITVS *aut ſingultus aut conuulſio aut delirium, malum.*

7.37 *Quicunque ſanguinem* VOMVNT, *ſi ſine febre, ſalubrius quidem (eſt); ſi uero cum febre, malum. mederi autem (oportet) adſtringentibus & refrigerantibus.*

7.74 *Poſt ſanguinis* VOMITVM, *tabes & puris per ſuperiora purgatio; poſt tabem fluxio ex capite, poſt fluxionem, diarrhœa; poſt diarrhœam, purgationis per ſuperiora retentio; poſt retentionem, mors.*

VRINA.

2.12 *Item* VRINAE, *& (alui) excrementa, & ſudores, ſi poſtea appareant; tum iudicatu difficiles & faciles, tum breues & longos morbos (fore) indicant.*

4.69 *Quibus* VRINAE *craſſæ, grumoſæ, & paucæ non ſine febre exiſtentibus, ſi multitudo ex ijs aduenerit tenuis, iuuat: præcipue autem tales ab initio exeunt, aut breui ſedimen obtinent.*

4.70 *Quibus in febribus* VRINAE *perturbatæ*

ſunt ueluti iumenti alicuius,ijs capitis dolores uel adſunt uel aderunt.

4.71 *Quibus ſeptimo die iudicium fit,ijs nubeculam obtinet* V R I N A *quarto die rubram,& alia(ſigna)ſecundum proportionem.*

4.72 *Quibus* V R I N A E *tranſparentes & albæ, malæ,præcipue autem ſi in phreniticis apparuerint.*

4.73 *Quibus hypochondria inflata murmurant lumborum dolore ſuccedente,alui ijs humectantur,niſi flatus erumpant aut* V R I N A E *multitudo adueniat.in febribus autem hæc.*

4.74 *Quibus ſpes eſt in articulis fore abſceſſum, liberat ab abſceſſu* V R I N A *multa & craſſa & alba quæ exit,ut in laborioſis febribus quarto die nonnullis exire incipit.ſi uero etiam e naribus ſanguis efflux erit,etiam breui admodum liberatur(æger).*

4.75 *Si(quis)ſanguinem aut pus mingat, renum aut ueſicæ ulcerationem ſignificat.*

4.76 *Quibus in* V R I N A *craſſa exiſtente caruncul æ exiguæ aut ueluti capilli una exeunt,ijs a renibus excernuntur.*

4.77 *Quibus in* V R I N A *craſſa exiſtente quædam furfurea ſimul eminguntur,iis ueſica ſcabie laborat.*

4.78 *Quicunque repente ſanguinem mingunt, iis a renibus uenulæ ruptionem ſignificat.*

4.79 *Quibus in* V R I N A,*arenoſa ſubſidunt,iis ueſica laborat calculo.*

4.80 *Si (quis) ſanguinem mingat & grumos, &* V R I N AE *ſtillicidium habeat, & dolor incidat in imum uentrem, et pectinem et interfœmineum, ea quæ circa ueſicam ſunt, laborant.*

4.81 *Si (quis) ſanguinem & pus mingat, & ſquamulas, &* V R I N AE *grauis odor fuerit, ueſicæ ulcerationem ſignificat.*

4.82 *Quibus in* V R I N A R I A *fiſtula tuberculum oritur, iis ſuppurato & erupto, (mali fit) ſolutio.*

4.83 *Mictio noctu ſi fiat multa, exiguam deiectionem ſignificat.*

V R I N AE S T I L L I C I D I V M L. S T R A N G V R I A.

V R I N AE D I F F I C V L T A S L. D Y S V R I A.

7.31 *Quibus febricitantibus in* V R I N I S *ſedimenta (ſunt), ueluti craſſæ farinæ, longum morbum ſignificant.*

7.32 *Quibus (in* V R I N I S *nunc ſunt) ſedimenta biliosa, (quæ fuerunt) antea tenuia, acutum morbum ſignificant.*

7.33 *Quibus inæquales* V R I N AE *exeunt, iis perturbatio uehemens in corpore eſt.*

7.34 *Quibus in* V R I N I S *ſuperſtant bullæ, renalem ægritudinem & longam fore ſignificant.*

7.35 *Quibus uero pinguis (in* V R I N I S *eſt) inſidentia & conferta, iis renum uitia & acuta ſi-*

gnificant.

7.57 Quibus in VRINARIA fiſtula tubercula fiunt, iis ſuppuratione facta & eruptione ſoluitur dolor.

VTERVS L. MVLIER.

VVLNVS.

4.2 Si VVLNERI conuulſio ſuperuenerit, letale.

5.66 Si in VVLNERIBVS profundis & prauis tumor non appareat, ingens (eſt) malum.

FINIS.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

VENETIIS Apud Balthaſſarem Cōſtantinum, ad ſignum Diui Georgij. M D L V.

57.

Cav. G. DI GIACOMO
Restauro del Libro Antico
PESCARA
1971